



26º CONGRESSO BRASILEIRO DE  
**PERINATOLOGIA**  
Florianópolis-SC

#NeoJuntos  
**11 A 14**  
**DE OUTUBRO**  
CentroSul Florianópolis  
Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, Florianópolis - SC



## Trabalhos Científicos

**Título:** Aleitamento Materno Exclusivo: Motivadores Pessoais, Variáveis Relacionadas E Fatores Preditivos

**Autores:** GABRIELA MARENGO BARTH (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO), CAROLINA ANGELI KALAF MUSSI (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO), IZILDA DAS EIRAS TÂMEGA (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO)

**Resumo:** [INTRODUÇÃO] - O aleitamento materno exclusivo (AME) é preconizado pela Organização Mundial da Saúde até seis meses de idade. A análise do desmame precoce é relevante para direcionar os serviços de saúde para proteção, promoção e apoio ao AME. [OBJETIVOS] - A pesquisa teve como objetivos: a) analisar quantitativamente motivações pessoais do desmame precoce, b) determinar fatores associados ao sucesso do AME, c) realizar análise preditiva da ocorrência do desmame precoce, d) verificar a aderência dos resultados da pesquisa aos dados da literatura. [METODOLOGIA] - Foram aplicados 100 questionários às mães de crianças atendidas ambulatorialmente. Realizou-se análise descritiva das motivações das mães para o desmame precoce. Posteriormente, com o teste qui-quadrado, verificou-se a existência de associação estatisticamente significativa entre desmame precoce e variáveis mencionadas na literatura (alfa = 10%). Finalmente, para determinar as variáveis preditoras do desmame precoce, utilizou-se a técnica Classification and Regression Trees. Como ferramenta computacional, utilizou-se linguagem R, software R Studio e biblioteca rpart. [RESULTADOS] - Constatou-se que a principal razão declarada do desmame precoce foi o retorno ao trabalho (26%), corroborando com a literatura, seguindo-se por sensação de falta de leite (23%) e dificuldade na amamentação (20%). Quanto às variáveis associadas ao AME, apenas permanência em alojamento conjunto teve significância estatística, visto que, em relação às demais variáveis estudadas (incentivo paterno, orientação durante a gestação, parto vaginal, auxílio de profissionais, apoio da avó materna e não-fumante), apesar de estarem relacionados com AME, não houve associação estatisticamente significativa - entretanto, esse achado não descarta uma possível relação positiva entre as variáveis e menores taxas de desmame precoce, necessitando-se de amostras maiores para obter significância estatística. Quanto aos fatores preditores do desmame precoce, o nível de escolaridade foi a variável mais relevante, seguindo-se de idade materna e orientação sobre amamentação. [CONCLUSÃO] - Os benefícios materno-infantis advindos da AME estão consolidados na literatura mundial. Todavia, a proporção de desmame precoce na amostra estudada foi 63%. Os resultados obtidos na pesquisa, em aderência à literatura, permitem compreensão dos principais motivadores pessoais do desmame precoce, determinação das variáveis associadas ao AME, bem como determinação dos fatores preditivos do desmame precoce, contribuindo para evolução das políticas públicas dirigidas ao AME.