



26º CONGRESSO BRASILEIRO DE  
**PERINATOLOGIA**  
Florianópolis-SC

#NeoJuntos

11 A 14  
DE OUTUBRO

CentroSul Florianópolis  
Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, Florianópolis - SC



## Trabalhos Científicos

**Título:** Hemangiomas Progressivos Em Recém-Nascido Prematuro

**Autores:** MARCELA RIBEIRO FARDIM ABREU (SANTA CASA VITÓRIA/VILA VELHA HOSPITAL), DANIELA FRANCO HILÁRIO (SANTA CASA VITÓRIA/VILA VELHA HOSPITAL), IURI CORDEIRO ROCHA (SANTA CASA VITÓRIA/VILA VELHA HOSPITAL), GUSTAVO SILVA SAMPAIO (SANTA CASA VITÓRIA/VILA VELHA HOSPITAL), JOVANNA COUTO ANECHINE CASER (SANTA CASA VITÓRIA/VILA VELHA HOSPITAL), CONSUELO MARIA CAIFA FREIRE JUNQUEIRA (SANTA CASA VITÓRIA/VILA VELHA HOSPITAL), ADRIANA AMARAL DIAS (SANTA CASA VITÓRIA/VILA VELHA HOSPITAL), ANDREA LÜBE ANTUNES DE S. THIAGO PEREIRA. (SANTA CASA VITÓRIA/VILA VELHA HOSPITAL)

**Resumo:** [INTRODUÇÃO] - O caso aborda um recém-nascido (RN) prematuro moderado, que não apresentava lesões dermatológicas aparentes ao nascimento, evoluindo com hemangioma infantil potencialmente de alto risco, de rápida progressão. [OBJETIVOS] - RN 30 semanas, GIG, sem alterações iniciais ao exame físico. Na primeira semana de vida identificado lesões róseas claras em face e pescoço. Na segunda semana de vida, evidenciado hemangiomas de crescimento rápido, em região pré-auricular esquerda, região cervical, região malar esquerda e base de língua, sem comprometimento de vias aéreas e sistema nervoso, com boa evolução após início do tratamento com propranolol. [METODOLOGIA] - Relato de caso [RESULTADOS] - O bebê do caso relatado está em uso de propranolol 0,5mg/kg/dose duas vezes ao dia, iniciado com cerca de 5 semanas de vida. Os hemangiomas estão em involução, com coloração mais clara, apresentando um curso favorável. [CONCLUSÃO] - Os hemangiomas infantis ocorrem em até 5% dos lactentes, sendo o tumor benigno mais comum da infância. A maioria deles é pequena e não requer tratamento. No entanto, a depender do seu tamanho ou localização, uma minoria significativa pode ser potencialmente problemática, cursando com cicatrizes, ulcerações ou outras anormalidades associadas. O tratamento, de forma geral, é feito com medicação e acompanhamento clínico. O conhecimento sobre hemangioma infantil aumentou muito na última década, o que permitiu uma melhora no atendimento, redução na morbidade e definição quanto ao risco de complicações e necessidade de intervenção. Melhores resultados são alcançados com a educação familiar, o acompanhamento por profissional experiente, o uso de medicamentos e de outras terapêuticas como laser. O paciente descrito está sendo acompanhado e, sua família, constantemente orientada. A indicação do uso do propranolol foi oportuna devido à localização, extensão e evolução das lesões, o que neste caso, parecem apresentar um bom prognóstico para o paciente.