



26º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PERINATOLOGIA
Florianópolis-SC

#NeoJuntos
11 A 14
DE OUTUBRO
CentroSul Florianópolis
Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, Florianópolis - SC



Trabalhos Científicos

Título: Rastrear Ou Não Rastrear Displasia Do Desenvolvimento Do Quadril? Proposta De Protocolo Assistencial

Autores: SANDRA LUCIA ANDRADE DE CALDAS LINS (HOSPITAL SANTA LÚCIA SUL), MARTA DAVID ROCHA DE MOURA (HOSPITAL SANTA LÚCIA SUL), MARIANA GONÇALVES FERRER (HOSPITAL SANTA LÚCIA SUL)

Resumo: [INTRODUÇÃO] - A triagem de bebês para displasia coxofemoral é um tema controverso, com opiniões divergentes sobre seu valor. Embora seja amplamente reconhecido que o exame do recém-nascido é importante, ele ainda pode deixar passar cerca de um em cada 10 quadris luxados, devido à possibilidade de imprecisão do exame ou porque o quadril pode luxar posteriormente [OBJETIVOS] - O objetivo deste estudo é realizar uma revisão da literatura e desenvolver um protocolo assistencial para avaliação e triagem da displasia do desenvolvimento do quadril. [METODOLOGIA] - Realizamos uma revisão sistemática da literatura e elaboramos um protocolo clínico para uma unidade neonatal terciária. Foram analisados 23 artigos em três idiomas: inglês, português e espanhol. [RESULTADOS] - Com base na análise dos artigos selecionados, foram estabelecidos os critérios para a realização da ultrassonografia do quadril em recém-nascidos. O protocolo de triagem definiu em linhas gerais: Exame clínico de Ortolani no nascimento, no primeiro dia de vida e no segundo dia de vida. O Recém-nascidos com resultado positivo no teste de Ortolani, ultrassonografia do quadril realizada, avaliação por ortopedista pediátrico e, se necessário, instalação de suspensório de Pavlic. Recém-nascidos com resultado negativo no teste de Ortolani, mas que apresentem fatores de risco, como histórico familiar de displasia do quadril ou parto pélvico, devem ser submetidos a ultrassonografia do quadril e avaliação pelo ortopedista pediátrico para decisão da melhor intervenção. [CONCLUSÃO] - Com base nas evidências disponíveis, não podemos fazer uma recomendação conclusiva para a triagem universal com ultrassom do quadril. Entretanto, para bebês com quadris instáveis ou levemente displásicos, o uso de ultrassom precoce, a fim de direcionar a imobilização e possível reduzir significativamente a taxa de diagnóstico tardio de Displasia do Quadril bem como a necessidade de cirurgia.