

Trabalhos Científicos

Título: Perfil Epidemiológico Da Sífilis Congênita Em Uma Maternidade Em Nilópolis, Rio De Janeiro

Autores: ELIANE CABRAL R. DE ARAÚJO (HMDL), ALESSANDRA RIBEIRO FRANCO (HMDL), MARIA EDUARDA DE BARROS PARDELHAS (HMDL), PATRICIA MARA RIBEIRO SILVA (HMDL), ROBERTO FALCI GARCIA (HMDL), SARAH CRISTINA C. SANTOS (HMDL), ANDRESSA DA SILVA ALMEIDA (HMDL), SYLVIA VIANA F. SILVA (HMDL), LARISSA CARVALHO PEREIRA (HMDL), LARISSA MOREIRA REIS (HMDL), PEDRO HENRIQUE B. BRAGA (HMDL), ELOÁ RODRIGUES MARQUES (HMDL), MARIANA ARREPIA FERNANDES (HMDL)

Resumo: [INTRODUÇÃO] - A sífilis consiste em uma infecção bacteriana sistêmica que pode ser transmitida verticalmente em casos de gestantes não tratadas ou tratadas de forma inadequada. O acometimento fetal pode evoluir com manifestações congênitas precoces ou tardias. [OBJETIVOS] - Avaliar o perfil epidemiológico dos casos de sífilis congênita em uma Maternidade da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro [METODOLOGIA] - Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo desenvolvido em uma maternidade privada na baixada fluminense. [RESULTADOS] - A amostra foi constituída por recém-nascidos (RNs) expostos à sífilis com VDRL reagentes e não reagentes. Os dados foram fornecidos pela Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) da instituição, referentes ao ano de 2022. No ano de 2022 foram identificados um total de 21 casos de RNs expostos à sífilis, todos nascidos vivos e sem anomalias. Do total de casos, 17 recém-nascidos apresentaram VDRL reagente em sangue periférico (80,9%). Não houve casos com VDRL reagente em liquor. Todos os casos da amostra foram tratados devido à exposição ao agente etiológico da sífilis. Para o tratamento foram utilizados penicilina cristalina, procaína ou benzatina, com a média do tempo de internação de 9.3 dias [CONCLUSÃO] - O estudo demonstrou que a sífilis persiste como um problema de saúde pública, apesar de seu diagnóstico e tratamento eficazes. Destaca-se a importância de métodos mais idôneos de prevenção e controle da sífilis no atendimento pré-natal.