



26º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PERINATOLOGIA
Florianópolis-SC

#NeoJuntos
11 A 14
DE OUTUBRO
CentroSul Florianópolis
Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, Florianópolis - SC



Trabalhos Científicos

Título: Aspectos Clínicos Da Coinfecção Por Hiv E Sífilis Na Gestaç o E Da Exposi  o De Rec m-Nascidos Atendidos Em Hospital Pedi trico De Santa Catarina

Autores: LAURA KUERTEN PAMPLONA DA SILVA (UNISUL), MARIA JULIA KUHNEN DUTRA (UNISUL), JULIA KELLERS DE SOUZA (HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSM O), AROLD PROHMANN DE CARVALHO (UFSC), S NIA MARIA DE FARIA (HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSM O), EMANUELA DA ROCHA CARVALHO (HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSM O / UFSC)

Resumo: [INTRODU  O] - As infec  es sexualmente transmiss veis afetam frequentemente gestantes e rec m-nascidos (RN). O HIV e a S filis s o transmitidos verticalmente para crian as. A coinfec  o dessas doen as requer aten  o especial devido  s suas implica  es cl nicas. [OBJETIVOS] - Descrever aspectos cl nicos da coinfec  o HIV/s filis na gesta  o e da exposi  o de rec m-nascidos (RN)  s infec  es atendidos em um hospital de refer ncia pedi trica em Santa Catarina entre 2015 e 2020. [METODOLOGIA] - Estudo observacional, descritivo, secund rio a uma linha de pesquisa de coleta de dados em prontu rio eletr nico de um hospital pedi trico terci rio de Santa Catarina no per odo de janeiro de 2015 a dezembro de 2020. Aprovado pelo CEP da institui  o sob o parecer 4.713.439 [RESULTADOS] - Analisados 678 prontu rios com CID Z.206 (contato com e exposi  o ao HIV), nos quais 71 (10,5%) RN foram expostos   coinfec  o HIV e s filis. Destes, 37 (52,1%) eram do sexo masculino, 14 (19,7%) confirmaram diagn stico de HIV e 30 (42,2%) de s filis cong nita. Das gestantes coinfectadas, 38 (53,5%) possu am diagn stico do HIV pr vio   gesta  o, 53 (74,6%) usaram TARV e 40 (52,1%) utilizaram subst ncias il citas. Ainda, 34 (46,4%) obtiveram no m nimo 6 consultas pr -natais, 35 (49,3%) realizaram partos vaginais e 29 (40,8%) possu am quantifica  o RNA-HIV indetect vel no momento do parto. A profilaxia para o HIV do RN ocorreu em 66 (92,9%) dos casos. [CONCLUS O] - A an lise de gestantes coinfectadas por HIV/s filis constituiu-se de m es que receberam diagn stico pr vio   gesta  o, estavam em uso de TARV e, em sua maioria, tiveram parto de rec m-nascidos brancos, meninos e que receberam profilaxia ao HIV.