



26º CONGRESSO BRASILEIRO DE  
**PERINATOLOGIA**  
Florianópolis-SC

#NeoJuntos  
**11 A 14**  
**DE OUTUBRO**  
CentroSul Florianópolis  
Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, Florianópolis - SC



## Trabalhos Científicos

**Título:** Motivos Da Interrupção Do Aleitamento Materno Em Crianças De 0 A 2 Anos, Acompanhados Em Duas Unidades Básicas De Saúde Em Um Município Do Sul Do Brasil

**Autores:** SANDRA MARA WITKOWSKI (UNIVALI-UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI), CAMILA MENEGHEL VACCARO (UNIVALI-UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI), LUIZA BIM VIVIAN (UNIVALI-UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI), MARINA PERON BENAZZI (UNIVALI-UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI), JULIANA DINIZ BARBIERI (UNIVALI-UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI), ISABELLA CRISTINA CORDEIRO (UNIVALI-UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI), VANESSA PRISCILA WIESNER KROBEL (UNIVALI-UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI), PRISCILLA SEVERINO GONÇALVES DE CASTRO (UNIVALI-UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI)

**Resumo:** [INTRODUÇÃO] - O leite materno contém todos os nutrientes essenciais para o crescimento, desenvolvimento e proteção imunológica da criança, sendo o aleitamento materno (AM) considerado a intervenção com maior potencial para diminuir a mortalidade infantil. [OBJETIVOS] - Identificar os principais motivos de interrupção de AM através da pesquisa com os responsáveis por crianças de 0 a 2 anos de idade cadastrados em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) no município de Itajaí/SC. que apresentam perfil socioeconômico divergentes. [METODOLOGIA] - Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, baseado em coleta de dados por meio de questionário aplicado aos responsáveis das crianças de 0 a 24 meses. Foram elegidas duas UBS com perfil socioeconômico opostos, UBS A (baixo) e UBS B (alto), segundo dados da Secretaria de Saúde da cidade de Itajaí-SC. Aprovação em CEP sob nº 5.596.010 em 08/2022. [RESULTADOS] - Das 542 crianças entre 0 e 2 anos cadastradas na UBS A, foram entrevistadas 228 responsáveis, já das 28 crianças entre 0 e 2 anos cadastradas na UBS B, foram entrevistadas 28 responsáveis. Os principais motivos que levaram ao desmame na UBS A foram baixa produção de leite (9,7%), rejeição da criança (8,9%) e retorno da mãe ao trabalho (6,3%). Já na UBS B foram leite fraco (10,7%), rejeição da criança, doenças maternas e retorno ao trabalho (7,1%). Aproximadamente 50% das crianças da UBS A parou o aleitamento antes dos 6 meses e na UBS B 42,9%. [CONCLUSÃO] - A maior causa de desmame precoce foi relacionada as características do leite materno (hipogalactia), em ambas as UBS com perfil socioeconômico opostos. As taxas de desmame ainda são consideráveis, as informações adquiridas neste estudo são relevantes e poderão auxiliar os profissionais da saúde a proporcionar orientações adequadas. Palavras-chave: aleitamento materno, desmame, nutrição do lactante, saúde da crian