



26º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PERINATOLOGIA
Florianópolis-SC

#NeoJuntos
11 A 14
DE OUTUBRO
CentroSul Florianópolis
Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, Florianópolis - SC



Trabalhos Científicos

Título: Tumor Sólido Congênito: Importância Diagnóstica Pré-Natal

Autores: JAMILLE COUTINHO ALVES (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER), LUANA DE SOUZA MIOSSO (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER), RAFAELA CHAVES MORAES (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER), CAROLINA SILVA PEREIRA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER), BÁRBARA COUTINHO OLIVEIRA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER), MATEUS ALMEIDA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER), GIOVANI BARBOSA GUIMARÃES (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER), GUILHERME PINHEIRO DA SILVA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER), ADRIANA ZELENSKI (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER), LUIS FELIPE RIBAS CROTTI (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER), SYNARA SOUZA BRAGA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER), KARINNE DA MATA MISSIO LOMBARDI (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER), MARIANA CHAPADEIRO MACHADO BORGES (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER), ANA CARLA SANTOS OLIVEIRA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER), PATRICIA CRISTINA BORGES FLORENCIO (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER), GEORGES BADIN HOFMEISTER (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER), GLAUCIA DUARTE PREZA FIGUEIREDO (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER)

Resumo: [INTRODUÇÃO] - Teratomas são tumores sólidos, originados de células totipotentes, raros em região cervical, de origem benigna. Contudo, quando volumosos, podem levar a óbito por obstrução de vias aéreas e consequente insuficiência respiratória. [OBJETIVOS] - Mãe de 25 anos, primigesta, apresentou, durante o pré-natal, evidência de feto com múltiplas malformações. Ressonância Magnética realizada com 29 semanas e 3 dias mostrou massa cervical voltada em direção posterolateral, sólida, de alta celularidade e limites mal definidos, envolvendo vértebras em região cervical, porém, sem extensão ao canal vertebral ou desvio da medula, com proximidade à traqueia, sem desvio significativo. Submetida a parto cesárea por sofrimento fetal agudo e sinais de centralização fetal com 34 semanas. Recém-nascido (RN) pré-termo tardio, feminino, má vitalidade ao nascimento, com necessidade de reanimação neonatal, Apgar 7/8. Encaminhado à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neonatal, onde foi realizado intubação orotraqueal por falha na ventilação não invasiva (VNI). Após estabilização clínica e extubação, foi submetida a Tomografia Computadorizada, sendo identificado formação expansiva com componentes sólidos, heterogênea, com calcificações difusas, possíveis áreas de necrose em região cervical posterior, estendendo-se inferiormente a posição cervico-torácica, invadindo o interior do canal vertebral através dos forames neurais à direita, aos níveis de C2 até C5, atravessando a linha média contralateralmente, medindo 5,6 cm em seu maior eixo, configurando provável compressão sobre coluna vertebral. Além disso, nodulações em fígado, com cerca de 1 cm, desvio de rotação do rim esquerdo e possível agenesia de cóccix. Análise clínica e radiológica sugere teratoma e hemangioendotelioma. RN permanece sob cuidado com equipe multidisciplinar. [METODOLOGIA] - [RESULTADOS] - . [CONCLUSÃO] - Os teratomas são tumores com componentes de mais de uma camada germinativa, comuns em região sacrococcígea e nas gônadas. Sua característica pode ser cística, sólida ou mista. Seu diagnóstico pode acontecer ainda no período neonatal, com maior sensibilidade após as 15 semanas, por meio de ultrassonografia, estando ou não associado a polidrâmnio. O tratamento é cirúrgico, geralmente curativo, além de suporte respiratório e hemodinâmico. Conclui-se a importância do diagnóstico pré-natal dos teratomas cervicais, a fim de garantir nascimento em centro especializado com acesso a terapêutica precoce.