



31º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Urgências e
Emergências
Pediátricas**

24 a 26 | novembro | 2022
Hotel Windsor Oceanico
Rio de Janeiro, RJ



Trabalhos Científicos

Título: Obstrução Intestinal Por Fitobezoar De Semente De Acerola

Autores: MAÍSA SANTOS VALDERRAMAS TALON (HOSPITAL ESTADUAL SANTA CASA DE CUIABÁ), ANNA CAMILA BAIOTO PINA REIS (UNIENVAGÉLICA DE ANÁPOLIS), ANA LAURA JUNQUEIRA DE SOUZA (UNIFAI ADAMANTINA), BYANCA PEREIRA BORGES (UNIVERSIDADE CEUMA), CAMILA DE BONA RODRIGUES SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO), EDUARDA MACHADO NASCIMENTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO), MELISSA GOMES VIEIRA XAVIER (UNIFAMINAS MURIAÉ), PIETRA PIRES DO CARMO SOARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI)

Resumo: Fitobezoes são compostos vegetais parcialmente ou não digeridos que se acumulam no trato digestivo, podendo ser constituídos por fibras ou sementes. São causas raras de obstrução intestinal, porém acometem especialmente as crianças, independente de outros fatores de risco. Por ser condição rara e de literatura escassa, este trabalho apresenta um caso de obstrução intestinal parcial por semente de acerola, objetivando discorrer sobre suas manifestações clínicas e condutas. Descrição: Menina, 10 anos, refere constipação intestinal há 5 dias, após ingerir grande quantidade de acerolas com sementes, associada a dor abdominal intensa, picos febris e saída de fezes em soiling, acompanhadas de hematoquezia, conteúdo mucóide e grânulos da semente. Ao exame físico, levemente desidratada, afebril, abdome distendido e doloroso à palpação profunda, ruídos hidroaéreos aumentados. Exame anal revela hiperemia intensa e fezes como descritas na anamnese. À radiografia de abdome, fezes em cólon descendente e reto, com distensão gasosa a montante, com aspecto radiológico de 'miolo de pão'. O tratamento clínico não obteve boa resposta, sendo indicado extração manual do fitobezoar sob anestesia geral, com boa evolução pós-operatória. Discussão: Por seu tamanho reduzido, sementes geralmente percorrem o trato gastrointestinal, acumulando-se no reto, ocluindo-o parcial ou totalmente. Assim, o paciente apresenta parada ou redução da eliminação de fezes e flatos, distensão abdominal importante e dor difusa à palpação, quadro de obstrução intestinal baixa confirmado por radiografia simples de abdome. A conduta é inicialmente clínica, optando-se por extração manual sob anestesia geral quando ocorre falha terapêutica. Casos refratários e sofrimento de alça são indicativos de conduta cirúrgica. Conclusão: A obstrução intestinal por fitobezoar de semente de acerola é uma condição rara e possui escassos relatos na literatura. Portanto, este caso objetiva demonstrar sua ocorrência e ressaltar a importância de um bom exame clínico para o manejo rápido e resolutivo dos quadros na emergência.