



3º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Urgências e
Emergências
Pediátricas**

24 a 26 | novembro | 2022
Hotel Windsor Oceanico
Rio de Janeiro, RJ



Trabalhos Científicos

Título: Síndrome De Rapunzel: Um Relato De Caso Sobre Tricobezoar

Autores: LUANNA PRADO CAZELLI (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), JANAINA DE OLIVEIRA POY (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), SILVIA NAOMI ETO (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), MANUELA MARIA INSUELLOS BESEN (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), SILVANA ANTONIETTA D'ALESSIO DE SOUZA (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO)

Resumo: **INTRODUÇÃO:** Bezoares são formações na luz do trato digestivo resultantes da ingestão de materiais orgânicos ou inorgânicos não digeríveis. O acúmulo de cabelos no tubo digestivo é chamado de tricobezoar. **OBJETIVO:** Relatar o caso sobre tricobezoar em serviço de pediatria de hospital escola no estado de São Paulo. **JUSTIFICATIVA:** Alertar pediatras para tal manifestação incomum e incluí-la nos diagnósticos diferenciais de dor abdominal. **DESCRIÇÃO DO CASO:** C.V., oito anos, sexo feminino, procura pronto socorro infantil com queixa de êmese pós alimentar há dois meses, dor abdominal associada há duas semanas e constipação. Ao exame físico, apresentava massa abdominal palpável endurecida e volumosa em hipocôndrio esquerdo. Exames laboratoriais não apresentavam alterações, e ultrassonografia de abdome demonstrou formação sólida inespecífica. Realizada tomografia computadorizada para complementar investigação, evidenciando acentuada distensão gástrica e duodenal com material intraluminal heterogêneo, com focos gasosos de permeio. A hipótese de tricobezoar foi aventada devido hábito de tricofagia em paciente, sendo confirmada através da realização de endoscopia digestiva alta. Iniciada antibioticoterapia (metronidazol e ceftazidima) com necessidade da realização de laparotomia exploradora com gastrotomia e drenagem de cavidade para retirada do corpo estranho. Solicitada avaliação da psiquiatria e psicologia, que evidenciaram sintomas ansiosos e tricofagia há quatro anos, sendo necessário o acompanhamento psicoterápico continuado. **DISCUSSÃO:** O bezoar relacionado a síndrome de Rapunzel, o tricobezoar, é caracterizado pelo acúmulo de cabelos no tubo digestivo. Essa manifestação está associada principalmente a crianças e adolescentes do sexo feminino com distúrbios psiquiátricos, podendo provocar dor epigástrica, vômitos com a presença de cabelos, secreção fecalóide, massa abdominal palpável, obstrução do trato gastrointestinal e até perfuração da parede gástrica. **CONCLUSÃO:** A tricotilomania e tricofagia associados aos sintomas ansiosos evoluíram para tricobezoar com consequente abordagem cirúrgica para resolução do quadro clínico. É imprescindível considerar os bezoares como diagnósticos diferenciais de dor abdominal na pediatria.