



Trabalhos Científicos

Título: Meningite Viral Em Neonato - Relato De Caso

Autores: ANA PAULA MACHADO FRIZZO (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ), ROBERTA HERINGER FREIRE BRAGATTO (UNIVERSIDADE IGUAÇU), RAFAELA DE SOUZA AZEVEDO GOULART AMARO (UNIVERSIDADE IGUAÇU), ANDRÉ PANCRÁCIO ROSSI (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ), LORENA DE FREITAS GOTTARDI (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ), LUIZA RAMOS KELLY LESSA (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ), TARCÍLIO MACHADO PIMENTEL (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ), REBECA DOS SANTOS VEIGA DO CARMO (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ), JÚLIA SANTOS PINTO DA SILVA (UNIVERSIDADE IGUAÇU), MARCO ANTÔNIO GOMES ANDRADE (UNIVERSIDADE IGUAÇU)

Resumo: Apresentação do Caso: R.D.R, sexo masculino, 21 dias de vida. Mãe relata que paciente apresentou picos febris (38°C) aos 9 dias de vida, encaminhado para internação após permanecer na unidade de emergência por 12 dias em uso de antibioticoterapia com Ampicilina e Amicacina por 12 dias, sem melhora, sendo transferido ao Hospital referência para investigação. Ao exame físico da admissão se apresentava sem alterações, porém com relato de febre nas últimas 12 horas. Ao exame laboratorial na admissão, apresentava leucocitose com 17.000 leucócitos e PCR de 2.4, sem outras alterações no rastreio infeccioso. Foi portanto solicitado análise de líquido com resultado de aspecto incolor, límpido, com 48 mm³ de leucócitos (100% Linfócitos), 74,2 mg/dl proteínas, 27,1 mg/dl de glicose, levando ao diagnóstico de Meningite Viral. Após o resultado foi iniciado Aciclovir durante 10 dias. Discussão: A Meningite caracteriza-se por uma inflamação que envolve as membranas cerebrais e o líquido cefalorraquidiano (LCR). As meningites virais são mais prevalentes, mas evoluem de forma benigna, embora a faixa etária de maior risco seja a menor de 5 anos. Nesse caso o agente causador é principalmente o Enterovirus, dentre os quais se destacam os Poliovírus, os Echovírus e os Coxsackievírus. O quadro clínico da meningite independe da etiologia, sempre evoluindo com alteração neurológica. Em relação ao diagnóstico da doença e a detecção do agente etiológico realiza-se a análise do líquido cefalorraquidiano. Comentários Finais: O caso relatado traz à luz a discussão sobre a Meningite Viral ser uma etiologia com afecção à faixa pediátrica, especialmente em neonatos, que são susceptíveis as formas mais graves da doença. As evidências científicas apontam que é uma afecção benigna que raramente deixa sequelas. Entende-se ainda que é uma doença epidêmica, e sazonal, que pode ocorrer de forma isolada, mas comumente ocorre por surtos.