3º CONGRESSO BRASILEIRO DE Urgências e Emergências Pediátricas
24 a 26 | novembro | 2022
Hotel Windsor Oceanico
Rio de Janeiro, RJ
sociedade brasileira de pediatria

Trabalhos Científicos

Título: Perfil De Internações Em Indivíduos De Até 14 Anos Por Exposição A Fontes De Calor E Substâncias Quentes Na Bahia: Uma Análise Do Período De 2012 A 2022.

Autores: EMERSON RAÍ ARAÚJO AZEVEDO (UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA), LAILSON JOAQUIM DA SILVA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA), ANA CAROLINA SILVA CRUZ (UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA), MARIA EDUARDA CARVALHO BANDEIRA (UNIFTC), LUANA DE ANDRADE OLIVEIRA CARVALHO (UNIFTC), KATHARINA ANDRADE DE BRITO (UNIFTC), PEDRO PINHEIRO DORIA PINTO (UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA), ANA FLÁVIA SOUTO FIGUEIREDO NEPOMUCENO (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA)

Resumo: Objetivo: Traçar8204, 8204,o8204, 8204,perfil8204, 8204,epidemiológico8204, 8204,da8204,s internações, em indivíduos de até 14 anos, por exposição a substâncias quentes na Bahia, Brasil 8204,entre8204, o período de8204, junho 2012 a junho 2022. Metodologia: Foi realizado um estudo epidemiológico de série temporal referente às hospitalizações por substâncias quentes, no estado da Bahia, Brasil. As informações foram obtidas através do Sistema de Informações de Saúde do Ministério da Saúde do país. Foram analisadas as variáveis total de internações, sexo,8204,8204, cor/raça,8204, 8204,regiões8204, 8204,e8204, 8204,faixa8204, 8204,etária.8204,8204, Resultados: Durante o período, foram registradas 1.089 internações no Sistema Único de Saúde por transtornos de exposição a fontes de calor e substâncias quentes na Bahia. Houve variação na incidência desses internamentos durante a década de estudo, passando de 0,42 por 100 mil habitantes em 2012, com pico de registros em 2019 (20,1%), possivelmente a fatores domiciliares. Evidenciou-se, maior prevalência de hospitalizações em indivíduos pardos (93,6%), com faixa etária de 1 a 4 anos (63,8%). Fatores como o perfil racial do estado e a maior fragilidade dessa faixa etária, podem justificar este achado. Destaca-se, 56,3% das hospitalizações totais foram compostas no sexo masculino, podendo estar associado ao tamanho populacional. Ademais, a média de permanência hospitalar foi de 4,7 dias e, dos quais, 4 óbitos (0,36%) foram contabilizados. Durante o período, gastou-se um valor total de 630.361,71$ com média de 578,84 reais com internações dessa motivação. Conclusão: Conclui-se que as queimaduras, constituem como um problema de saúde pública relevante para o estado da Bahia. A grande ocorrência em crianças menores de cinco anos chama a atenção pelo sofrimento físico e psicológico produzido, além do elevado custo econômico e social, incluindo gastos hospitalares. Nesse sentido, estratégias para prevenção e redução de internações dessa motivação devem ser estimuladas.