



3º CONGRESSO BRASILEIRO DE  
**Urgências e  
Emergências  
Pediátricas**

24 a 26 | novembro | 2022  
Hotel Windsor Oceanico  
Rio de Janeiro, RJ



## Trabalhos Científicos

**Título:** Abdome Agudo Como Uma Manifestação Incomum Na Tuberculose Peritoneal : Relato De Caso

**Autores:** MARIA LUIZA IBRAHIM ROCHA GUIMARÃES (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MATERNO INFANTIL - HUUFMA ), LISE FEITOSA NOVAIS MIRANDA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MATERNO INFANTIL - HUUFMA ), ANA JOSEPHY DA SILVA COSTA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MATERNO INFANTIL - HUUFMA ), MARIA EDUARDA IBRAHIM ROCHA GUIMARÃES (CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO - UNICEUMA), ISADORA MACHADO SANCHES (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MATERNO INFANTIL - HUUFMA ), KEVIN WAQUIM PESSOA CARVALHO (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MATERNO INFANTIL - HUUFMA )

**Resumo:** INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB) é uma doença infecto-parasitária causada pelo *Mycobacterium tuberculosis* que possui como principal sítio infeccioso o pulmão, mas também pode-se apresentar na forma extra-pulmonar. O acometimento peritoneal pela tuberculose representa 0,1-0,7% de todos os casos e a mortalidade é de aproximadamente 15%. O presente relato tem como objetivo apresentar um caso de tuberculose peritoneal em um adolescente de 16 anos que de forma rara abriu o quadro da doença acompanhado de abdome agudo, sendo submetido à uma laparotomia exploradora para diagnóstico. DESCRIÇÃO DO CASO : Paciente do sexo masculino, 16 anos, apresentou quadro de distensão abdominal e inapetência que evoluiu com perda progressiva de peso e dores abdominais de forte intensidade. Diagnosticado no serviço de urgência com abdome agudo e submetido à uma laparotomia exploradora de difícil penetração por abdome congelado. Foi visualizado, no ato cirúrgico, secreção purulenta em abundância nas goteiras e pelve, epíloon parcialmente necrosado, fortemente aderido e massa de alças intestinais que formavam um bloco compacto. Deixado dreno abdominal e colhido PCR para micobacterias e culturas do líquido peritoneal. Da amostra do líquido peritoneal foi solicitado TRM para tuberculose com resultado positivo e Hemoculturas para anaeróbios com resultado negativo. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO : A dificuldade e o atraso do diagnóstico da TB peritoneal pelas manifestações clínicas inespecíficas pode levar à complicações graves e incomuns como o do caso relatado à cima. Dessa forma, a tuberculose peritoneal deve ser lembrada como um diagnóstico diferencial do abdome agudo em jovens previamente imunocompetente.