Trabalhos Científicos

Título: Permanência Do Aleitamento Materno Entre Prematuros Acompanhados Em Serviço De Saúde De Referência Secundária

Autores: ALINE DE FREITAS SUASSUNA AUTRAN (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)); EVE GRILLO CARVALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)); CISSA SANTOS MOREIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)); AMANDA ROCHA SOARES ALMEIDA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)); DANIEL DEMÉTRIO MAGALHÃES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)); GISLAINE ROSA DE SOUZA OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)); CAMILA VIDOTTI CASTRO CORRÊA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)); ISABELLA BARBOSA SALGADO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)); LUIZA BRAGA FIGUEIREDO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)); BRUNNELLA ALCANTARA CHAGAS DE FREITAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV))

Resumo: Objetivo: analisar a duração do aleitamento materno entre prematuros acompanhados em serviço de saúde de referência. Métodos: trata-se de estudo transversal de coleta de dados de neonatos prematuros acompanhados em serviço de saúde multiprofissional de referência secundária, no período de 2010 a 2015. Foram incluídos recém-nascidos egressos da unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN), menores que 37 semanas. O aleitamento materno compreendeu tanto o aleitamento materno exclusivo (AME) quanto o misto, e sua duração considerou a idade gestacional corrigida (IGC). O termo “leite de vaca” referiu-se ao leite bovino in natura, mas não à formula infantil. Resultados: o estudo contou com 120 prematuros que receberam a primeira consulta ambulatorial no serviço de referência, em torno de 41 semanas de IGC. Estavam em aleitamento materno 73,8 dos pacientes. A duração mediana do aleitamento materno foi cinco meses e 81,7 dos neonatos utilizaram leite de vaca no primeiro ano de IGC. Conclusão: a curta duração do aleitamento materno entre prematuros alerta para a necessidade de ações visando sua promoção em todos os níveis de atenção, visto que é um fator protetor para o crescimento e desenvolvimento saudável. Além disso, o uso de leite de vaca tem repercussões nutricionais negativas e deve ser desestimulado durante o primeiro ano e vida.