



Trabalhos Científicos

Título: Manifestações Atípicas Do Sarampo Em Paciente Imunizado

Autores: ANA CAROLINA GATTO BORDIGNON (UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA), CAROLINA DISCONZI DALLEGRAVE (UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA), ARTHUR CONTE KASPER (UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA), VERNER GIOVANE DAHMER (UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA), KATIANE DE SOUZA RODRIGUES (UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA)

Resumo: **INTRODUÇÃO** O sarampo é uma doença infecciosa aguda, altamente contagiosa, de etiologia viral. A transmissão da doença ocorre por secreções nasofaríngeas (aerossóis) de 4 a 6 dias antes ou até 4 dias após o surgimento do exantema. Este relato tem como objetivo apresentar a evolução atípica do exantema em um paciente imunizado. **DESCRIÇÃO DO CASO** Paciente J.P.S.E., masculino, 2 anos, foi encaminhado a um Hospital de Santa Catarina devido a febre (39°C), coriza e tosse produtiva de quadro arrastado (15 dias). Mãe relata o surgimento de lesões eritematosas em abdome associadas a fotofobia, ainda, refere viagem recente para a região oeste do Paraná. Calendário vacinal completo. Exame físico: Lesões eritematosas que se estendiam da face até membros inferiores, presença de estertores creptantes bilaterais na ausculta pulmonar. Exames complementares: Espessamento peribroncovascular (RX de tórax). Imunoglobulinas M e G reagentes para sarampo. O paciente permaneceu em isolamento e foi tratado com vitamina A e Ceftriaxone (100 mg/kg/dia), devido a pneumonia. A regressão do exantema iniciou no 4º dia desde seu surgimento e o desaparecimento completo ocorreu no 6º dia. Após 7 dias internado o paciente obteve melhora clínica e radiológica do padrão respiratório. **DISCUSSÃO** O exantema do sarampo é do tipo maculopapular morbiliforme com progressão craniocaudal lenta. Em geral, emerge inicialmente na região cefálica (fronte, região retroauricular e de implantação capilar) e atinge tronco e extremidades em até 4 dias após o início da febre. No presente relato, as lesões iniciaram-se em abdome e o paciente apresentou picos febris anteriores ao rash por um período superior a 7 dias. Ao final da fase exantemática ocorre a descamação furfurácea (semelhante a farelo ou farinha), porém este paciente não apresentou qualquer tipo de descamação, somente houve clareamento das lesões. **CONCLUSÃO** Nota-se que apesar do sarampo ter características dermatológicas bem estabelecidas na literatura, devemos nos atentar para quadros atípicos – principalmente em pacientes vacinados.