



## Trabalhos Científicos

**Título:** Queilite Na Criança- Quando Suspeitar De Queilite Esfoliativa?

**Autores:** FERNANDA AGUIAR NUNES (HOSPITAL DA BALEIA//ISMD- INSTITUTO SUPERIOR DE MEDICINA E DERMATOLOGIA ), ANA MARINA CAMPAS DE FARIA (HOSPITAL DA BALEIA- ISMD- INSTITUTO SUPERIOR DE MEDICINA E DERMATOLOGIA//UFMG)

**Resumo:** INTRODUÇÃO:O acometimento labial na criança é um achado comum no consultório de dermatologia pediátrica.A dermatite perioral é uma condição que afeta a região perilabial e pode estar relacionado à lambedura contínua dos lábios.O fato de estar sempre umidificando a região faz com que a saliva macere a pele e remova os óleos protetores secretados pelas glândulas sebáceas. Essa maceração contínua configura muitas vezes uma linha hipocrômica ao redor dos lábios. A Queilite esfoliativa (QE),menos comum,acomete a região do vermelhão. Afeta geralmente mulheres jovens e está relacionada a inflamação crônica com formação de crosta e fissuras e também pode estar relacionada ao habito de lambedura contínua.Dentre as lesões que fazem diagnostico diferencial com a QE, podem ser citadas as queilites actinicas, glandular, de contato, plasmocitária, factícia e prurigo actinico.OBJETIVO:Visto a grande possibilidade de diagnósticos diferenciais acometendo a região labial na criança, principalmente quando relacionado à hábitos parafuncionais (lambedura),o relato visa apresentar sinais que facilitem a abordagem e suspeição do diagnostico de QE.RELATO DE CASO: Criança de 12 anos, atendida em UBS com queixa de lesão crônica em lábios. Caracterizava-se pela presença de crostas melicéricas associado a dor.(foto) Apresentava habito recorrente de lambedura labial podendo ser visto halo hipocrômico perilabial.Negava uso de cosmeticos locais. Iniciado tratamento com antibioticoterapia local associado a hidratação. Evoluiu com melhora porem retornou a apresentar os sintomas pouco tempo depois.Segue em acompanhamento e aguarda biopsia.DISSCUSSÃO/CONCLUSÃO: Habitios parafuncionais como morder e lamber os lábios podem desencadear mecanismos traumáticos iniciadores de um quadro de queilite porém não são responsáveis pela perpetuação da condição .O fato de apresentar halo hipocrômico é um importante indicio para se supeitar de tais habitios. Porem a recorrência do quadro, comprometendo movimentação labial,a fala, sorriso e ate mesmo alimentação associado a inflamação exuberante de caráter crônico e dor, leva a suspeitar de queilite esfoliativa.