



Trabalhos Científicos

Título: Moniletrix: Relato De Caso

Autores: GUSTAVO MOREIRA AMORIM (UNISUL), GABRIELA COELHO ITAYA (UNISUL), DANILO HANTSCHICK FERNANDES MONTEIRO (UFSC), EDUARDO DAN ITAYA (UNISUL)

Resumo: Introdução: A moniletrix é uma doença hereditária rara que acomete a haste capilar e forma estreitamentos alternados com áreas nodais. A falha na região internodal leva a quebra do cabelo. A manifestação clínica mais comum é a alopecia associada à queratose folicular. Tendo em vista o caráter raro da doença, o objetivo do presente relato é apresentar o caso de um paciente com história de moniletrix. Descrição do caso: Lactente masculino, 8 meses, apresentando queda importante e espontânea dos fios de cabelo e alteração na sua coloração, em acompanhamento ambulatorial. Ao exame, rarefação biparietal se estendendo ao vértice e região occipital. À tricoscopia visualizamos alternância entre bandas largas e estreitas das hastes capilares. Diagnóstico clínico, amparado pela tricoscopia, de Moniletrix. Em tratamento com Minoxidil tópico, há 4 meses, manifestando melhora da densidade capilar, porém mantendo queixa de queda e tração positiva ao exame. Discussão: Moniletrix é um termo de origem greco-latina que significa “cabelo em colar”. A doença se manifesta no 2º mês de vida ou, em alguns casos, na primeira infância. A tríade clássica consiste em cabelo moniliforme, pápulas ceratóticas perifoliculares e coiloníquia, resultando em cabelo ressecado, quebradiço, escasso e de comprimento limitado (1-2cm). Assim como referido na literatura, após os 2 meses e acompanhando a perda do lanugo, o cabelo normal foi substituído por fios moniliformes, com alopecia e alteração de coloração, sem ceratose pilar. O diagnóstico pode ser confirmado por meio da tricoscopia. Não havendo tratamento específico, optou-se pelo uso tópico de minoxidil 2 em solução sem propilenoglicol. Prognóstico é comumente pior durante a infância e apresenta melhora na fase adulta. Conclusão: A moniletrix é uma doença rara de manifestação primária capilar. A avaliação médica dermatológica, associada a tricoscopia permite o diagnóstico preciso da doença.