



Trabalhos Científicos

Título: Leishmaniose Tegumentar Americana (Lta): Uma Análise Estatística

Autores: KARINE FELIPE MARTINS (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA, UNICERRADO - GOIÁS), EDUARDA CRISTINA DIEL (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA, UNICERRADO - GOIÁS), ISADORA ROSA MAIA (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA, UNICERRADO - GOIÁS), BIANCA GABRIELLE FERREIRA MORAIS (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA, UNICERRADO - GOIÁS), LORRANY MENDONÇA MUNDIM SOARES (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA, UNICERRADO - GOIÁS), LÍDIA ANDRÉA KARIM GONÇALVES (FACULDADE DE MEDICINA DE VALENÇA - RIO DE JANEIRO), EDILENE ABDO RODRIGUES PIRES (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA, UNICERRADO - GOIÁS)

Resumo: INTRODUÇÃO: A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) trata-se de uma infecção não contagiosa causada por protozoário do gênero *Leishmania*, sendo uma doença de incidência considerável na população pediátrica. OBJETIVO: O objetivo desse trabalho foi realizar uma análise estatística sobre a prevalência da LTA em indivíduos do sexo masculino e feminino menores de 01 ano a 19 anos de idade, no estado de Goiás, entre os anos de 2007 a 2019. MÉTODO: Foi realizado um estudo transversal descritivo sobre Leishmaniose Tegumentar Americana em indivíduos menores de 01 ano a 19 anos, no estado de Goiás, por meio do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN) no DATASUS. As variáveis analisadas foram à faixa etária, sexo e região entre os anos de 2007 a 2019. RESULTADOS: Foram observados 683 casos de LTA em indivíduos menores de 01 ano a 19 anos no período de 2007 a 2019. Houve uma maior prevalência na faixa etária entre 15 a 19 anos, com 251 casos, enquanto uma menor prevalência em indivíduos menores de 01 ano, sendo 58 casos diagnosticados. Constatou-se ainda uma maior prevalência no sexo masculino, visto que foram identificados um total de 427 casos, contra 256 no sexo feminino. A maior frequência relativa quanto aos casos diagnosticados de LTA é de 36,75% na faixa etária de 15 a 19 anos, seguida de 28,55% entre 10 a 14 anos, posteriormente 15,51% para 05 a 09 anos e 10,68% de 01 a 04 anos e, por fim, na faixa etária com indivíduos menores de 1 ano tem-se a porcentagem de 8,49%. CONCLUSÃO: Portanto, observou-se que a faixa etária de 15 a 19 anos obteve maiores índices para a LTA, apresentando 36,75% dos casos diagnosticados.