



3º Simpósio Internacional
de NUTROLOGIA PEDIÁTRICA

16 a 18 de maio de 2012 | Fábrica de Negócios | FORTALEZA - CE

Trabalhos Científicos

Título:

Autores: REGINA LUCIA PORTELA DINIZ (FACULDADE CHRISTUS); SANDRA JOSEFINA FERRAZ ELLERO GRISI (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO); CHRISTIANE ARAUJO CHAVES LEITE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); DANILO SANTOS GUERREIRO (FACULDADE CHRISTUS); DAPHINIS DIANA BRITO CAVALCANTE (FACULDADE CHRISTUS); GERMANA BARROS OLIVEIRA OLIVEIRA DE FREITAS ALBUQUERQUE (FACULDADE CHRISTUS); GERMANA BASTOS PONTES (FACULDADE CHRISTUS); KAROLINE SARAIVA (FACULDADE CHRISTUS); RENATA CAVALCANTE LIMA (FACULDADE CHRISTUS)

Resumo: Objetivos “ Descrever o crescimento e o desenvolvimento de crianças indígenas da etnia Pitaguary durante o primeiro ano de vida. Material e métodos “ Estudo de coorte, prospectivo, descritivo. Durante 18 meses foram realizadas visitas mensais para registrar informações socio-demográficas e clínicas, com ênfase nos aspectos nutricionais, do desenvolvimento e morbidade. Resultados “ Foram incluídas 37 crianças. Considerando valores entre “2DP e +2DP em 12 meses da evolução do Peso (P), Estatura (E) e Peso para Estatura (P/E) de oito crianças do sexo feminino e 20 do sexo masculino observaram-se respectivamente: $P > +2DP$: 3/8 e 3/20; $P < -2DP$: 0/8 e 0/20; $E > +2DP$: 1/8 e 0/20; $E < -2DP$: 0/8 e 1/20; $P/E > +2DP$: 2/8; 3/20. 51,8% (14/27) das crianças não andaram sozinhas no tempo esperado, 67,6% (25/37) estavam com a vacinação em dia aos 12 meses de idade, 21,4% (6/28) e 35,7% (10/28) apresentaram respectivamente três ou mais episódios de diarreia e seis ou mais episódios de doença respiratória num período de 12 meses. Aleitamento materno exclusivo foi observado respectivamente no 1º, 4º e 6º meses de vida em: 95% (19/20); 69,2% (18/26) e 37,8% (14/37). Conclusões “ A grande maioria das crianças Pitaguarys manteve peso e estatura adequados num seguimento de 12 meses, metade não andava sozinha no tempo esperado, foi elevada a ocorrência de doenças diarreicas e respiratórias, cerca de um terço manteve-se em aleitamento materno exclusivo até seis meses e dois terços estavam com a vacinação em dia ao completar um ano de idade.