3º Simpósio Internacional de NUTROLOGIA PEDIÁTRICA
16 a 18 de maio de 2012 | Fábrica de Negócios | FORTALEZA – CE

Trabalhos Científicos

Título: Fatores Associados Ao Aleitamento Materno Exclusivo No Município De Sobral-ce Aos 6 Meses De Idade

Autores: CECÍLIA COSTA ARCANJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); CAIO PLÁCIDO COSTA ARCANJO (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA); FRANCISCO PLÁCIDO NOGUEIRA ARCANJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); VANESSA DANTAS RIBEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); NAYANNE AZEVEDO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); THAMARA VIEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); JANAÍNA TAPETI (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); LORENA SOARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ)

Resumo: Objetivos:Avaliar a prevalência de aleitamento materno exclusivo aos 6 meses de idade e fatores associados à prática desse aleitamento.Metodologia: Durante a campanha nacional de vacinação, 522 mães com filhos menores de 2 anos de idade foram convidadas aleatoriamente para responderem a um questionário estruturado sobre suas práticas atuais de aleitamento materno. Esse questionário também traçava o perfil socio-econômico e demográfico das entrevistadas. Foram avaliadas em particular nesse estudo as mães que estavam com lactentes de 6meses. Dez Unidades Básicas de Saúde da cidade de Sobral foram randomizadas para coleta desses dados, em agosto de 2010. A análise dos dados foi feita através do Epi Info 6.32, utilizando o Qui Quadrado de Pearlson, considerando associações significativas $p < 0,05$. Resultados: Foi encontrado prevalência de aleitamento exclusiva aos 6meses de 8,3%. O uso de mamadeiras apresentou associação significativa com menores taxas de aleitamento exclusivo aos 6m ($p=0,018$). Mães que trabalhavam, que não amamentaram na primeira hora de vida, números de consultas prenatais maior que sete, mães com mais de 9anos de estudo, presença de parto vaginal, uso de chupetas e baixo peso não se relacionaram com maior ou menor taxas de aleitamento exclusivo aos 2meses. Conclusão: A prevalência de aleitamento exclusiva aos 6meses foi muito baixa(8,3%). Essa baixa prevalência talvez tenha dificultado a apreciação de outros fatores associados a pratica de amamentação. O uso de mamadeira proporcionou menor pratica de aleitamento exclusivo aos 6meses.

http://www.sbp.com.br/trabalhos-de-congressos-da-sbp/3-simpsio-internacional-de-nutrologia-peditrica/0051-fatores-associados-ao-aleitamento-materno-exclusivo.pdf