



16 a 18 de maio de 2012 | Fábrica de Negócios | FORTALEZA - CE

Trabalhos Científicos

Título: Fatores Associados Ao Aleitamento Materno Exclusivo No Município De Sobral-ce Aos 2 Meses De Idade

Autores: CECÍLIA COSTA ARCANJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); CAIO PLÁCIDO COSTA ARCANJO (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA); FRANCISCO PLÁCIDO NOGUEIRA ARCANJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); VANESSA DANTAS RIBEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); ANA DIMÍTRIA GOMES PONTE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); NAYANNE AZEVEDO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); JANAÍNA TAPETI (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); THAMARA VIEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ)

Resumo: Objetivos: Avaliar a prevalência de aleitamento materno exclusivo aos 2 meses de idade e fatores associados à prática desse aleitamento. Metodologia: Durante a campanha nacional de vacinação, 522 mães com filhos menores de 2 anos de idade foram convidadas aleatoriamente para responderem a um questionário estruturado sobre suas práticas atuais de aleitamento materno. Esse questionário também traçava o perfil socio-econômico e demográfico das entrevistadas. Foram avaliadas em particular nesse estudo as mães que estavam com lactentes de 2 meses. Dez Unidades Básicas de Saúde da cidade de Sobral foram randomizadas para coleta desses dados, em agosto de 2010. A análise dos dados foi feita através do Epi Info 6.32, utilizando o Qui Quadrado de Pearson, considerando associações significativas $p < 0,05$. Resultados: Foi encontrado prevalência de aleitamento exclusiva aos 2 meses de 56%. Mães que trabalhavam, que não amamentaram na primeira hora de vida e que faziam uso de mamadeiras apresentaram associações significativas com menores taxas de aleitamento exclusivo aos 2m ($p=0,025$; $p=0,048$ e $p=0,005$ respectivamente). Números de consultas prenatais maior que sete, mães com mais de 9 anos de estudo, presença de parto vaginal, uso de chupetas e baixo peso não se relacionaram com maior ou menor taxas de aleitamento exclusivo aos 2 meses. Conclusão: A prevalência de aleitamento exclusiva não foi alta. Mães que trabalham durante a amamentação, que não amamentaram na primeira hora de vida, assim como o uso de mamadeira proporcionaram menor prática de aleitamento exclusivo aos 2 meses.