



16 a 18 de maio de 2012 | Fábrica de Negócios | FORTALEZA - CE

Trabalhos Científicos

Título: Consumo De Fibra Alimentar Em Neuropatas

Autores: TATIANA CARNEVALLI DE VUONO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO); FERNANDA LUISA CERAGIOLI OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO); PATRICIA FONSECA TEIXEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO); ROSE VEGA PATIN (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO); ANA PAULA BRIGATTO SIMÕES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO)

Resumo: Objetivo: Avaliar o consumo de fibras em pacientes com neuropatias. Método: Estudo do tipo transversal retrospectivo, com 70 pacientes de 1 a 16 anos, diagnosticados com neuropatias crônicas. Os dados foram colhidos das 3 primeiras consultas ambulatoriais por meio de três recordatórios. O consumo alimentar foi avaliado através de três recordatórios de 24h e utilizou-se como critério para adequação dos macronutrientes AMDR, e a fibra segundo Agostoni, 1995 e Williams, 1995. Os índices antropométricos IMC/I e E/I avaliados seguindo a OMS, 2006/2007. Foi definida como risco para o baixo consumo de fibra a via de administração sonda nasoentérica e gastrostomia aliadas ou não a via oral, e as consistências líquida/pastosa e líquida por via oral. Os dados foram analisados no programa STATA 8.0 através dos testes de Shapiro-Wilk, t-student e qui-quadrado, considerando $p < 0,05$. Resultados: Média e desvio padrão de idade foram de $5,59 \pm 4,45$ meses. Apresentaram comprometimento nutricional e estatural, 52,85% e 61,4% respectivamente. A ingestão de fibra foi inadequada em 41,42% dos pacientes. Nenhum fazia uso de módulo de fibra e apenas 2 utilizavam dieta enteral industrializada com fibra. Pré-escolares e escolares apresentaram menor risco para ingerir consistência definida como risco para baixo consumo de fibra ($p=0,032$). Consumo inadequado de carboidrato teve associação com o consumo inadequado de fibra ($p= 0,002$). O consumo inadequado de fibra teve associação com a via de administração definida com risco para o baixo consumo de fibra. Conclusões: O consumo de fibra apresentou-se reduzido, dependendo da via de administração e da consistência da dieta.