



36^º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro



Trabalhos Científicos

Título: Doença Da Arranhadura Do Gato, Um Relato De Caso

Autores: ANA LUISA RICCI BOER (UNICASTELO); ANA TIEME SHIMAZU FRIGERIO (UNICASTELO); LUIZ ANTONIO BARALDI (UNICASTELO); MAURO HATSUO SUETUGO (UNICASTELO); ALTAIR ANTONIO DE CARVALHO DA SILVA JUNIOR (UNICASTELO); LIVIA LUANA COSTA OLIVEIRA (UNICASTELO); CLEITIANE FREITAS LEAL (UNICASTELO); LORAÍNE DE OLIVEIRA FERNANDES (UNICASTELO); GIL ABDALLAH TOSTA (UNICASTELO)

Resumo: Introdução: A doença da arranhadura do gato também conhecida como Linforreticulose benigna é uma importante causa de linfadenopatia em crianças. Causada pela bactéria *Bartonella henselae*, ou mais raramente por *B. quintana*, 75% dos casos ocorrem após mordida ou arranhadura de gato. A principal manifestação clínica é a linfadenopatia, porém podem ser vistas complicações neurológicas e quadros mais raros como a síndrome oculoglandular de Perinaud. Descrição do caso: B.P., feminino, 11 anos, procurou atendimento com queixa de febre há 15 dias, apresentava emagrecimento e linfadenopatia em axila esquerda, dolorido à palpação. Durante o exame físico constatou-se lesão em mão causada por felinos. Foi solicitado hemograma que evidenciou anemia concomitante à leucocitose com predomínio de segmentados. Para análise da região axilar utilizou-se ressonância nuclear magnética. Frente ao laudo inconclusivo, diagnosticou-se Doença da Arranhadura do Gato por intermédio da biópsia do linfonodo. A terapêutica foi realizada com azitromicina, pois ceftriaxona e oxacilina não contribuíram para melhora clínica. Discussão: Arranhadura do gato é uma doença de evolução benigna cuja manifestação clínica mais comum é a linfadenopatia. Ela atinge preferencialmente a faixa etária entre 5 a 14 anos. O diagnóstico é feito diante de linfadenopatia com história de contato com gatos e concluído com biópsia do linfonodo. Porém há estudos que defendem a utilização de testes sorológicos como método não invasivo para o diagnóstico. Há formas atípicas que representam 10 a 15% dos casos em que diversos sistemas são atingidos e dificultam o diagnóstico. Estudo clínico mostra o benefício da azitromicina no tratamento da doença, porém outros autores defendem o tratamento passivo, considerando a doença como auto limitada. Conclusão: Doença da arranhadura do gato é uma importante patologia frente a uma criança com linfadenopatia. Realizar o diagnóstico adequado tem alta relevância a fim de evitar procedimentos desnecessários e realizar o tratamento adequado.