36º CONGRESSO BRASILEIRO DE PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro
CURITIBA | PR Expotrade Convention Center 8 A 12 DE OUTUBRO 2013

# Trabalhos Científicos

**Título:** Bifurcação Anatômica De Arcos Costais: Relato De Caso

**Autores:** RODRIGO MATTOS DOS SANTOS (UNESC); ELIMAR TEIXEIRA RICARDO (UNESC); ADRIANNA RIBEIRO COSTA PIRES (UNESC); BARBARA HOFFMANN LOLLI (UNESC); FABIO ALMEIDA MORAES (UNESC)

**Resumo:** Introdução: Costelas bífidas são anomalias congênitas,geralmente unilaterais,podendo envolver qualquer arco costal. Há poucas informações na literatura relacionada ao assunto, porém estima-se que acometa 0,15 à 3% de pacientes assintomáticos, sendo os valores consideravelmente menores quando se considera pacientes sintomáticos. Este achado pode ser independente ou pode estar associado a síndromes diversas, incluindo Sindrome do Nevo Basocelular (associada a alterações ósseas, cutâneas, oftalmológicas e neurais), Síndrome de Jobs (associada à infecções recorrentes e elevados índices de IgE) e Síndrome de Kindler. Devido à origem mesodérmica das costelas, podem haver maformações nos tecidos de mesma origem, como coração e rins. Descrição do Caso: Paciente masculino, 16anos, em acompanhamento no ambulatório de adolescência de uma Universidade no Sul de Santa Catarina, apresenta queixa de dor e queimação precordial, há 3anos, tipo fisgada, sem irradiação, sem fatores de alivio ou agravo. Nega dispneia e relação com exercício físico. Ao exame físico apenas nodulação em gradil costal, sem demais alterações relevantes. Realizado ECG, o qual se apresenta dentro das normalidades, e Raios-X de Tórax apresentando alterações no ligamento osteocondral da 5ª costela a direita pouco especificas.Prossegui-se com a TC de Tórax com ênfase em gradil costal, a qual mostrou: duplicação da região anterior do terceiro arco costal direito e do quarto arco esquerdo. Variante do normal.Paciente recebe orientações e encontra-se em acompanhamento sem demais queixas há 2meses. Comentários: O prosseguimento da investigação da costela bífida quando esta constítui achado ocasional em pacientes assintomáticos e sem outras alterações ao exame físico é de pouca valia. Porém quando associada à alterações de pele, ossos, sistema imune e neural, torna-se importante a investigação mais detalhada dos pontos de vista radiológicos e genéticos, para que assim se possa descartar a presença desta entidade como parte das síndromes já citadas, considerando que o paciente sofrerá um outro tipo de abordagem.