36º CONGRESSO BRASILEIRO DE PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro
CURITIBA | PR Expotrade Convention Center 8 A 12 DE OUTUBRO 2013

Trabalhos Científicos

Título: Características Clínicas Do Câncer Infanto-juvenil Em Um Centro De Referência No Oeste Do Paraná

Autores: EMYLLE MARLENE SOLIGO (UNIOESTE); CARMEM MARIA COSTA MENDONÇA FIORI (UNIOESTE); ALINE CARLA ROSA (UOPECCAN); ANDRÉ SHIGUEMITSU YAMASHITA (UNIOESTE); SIMONE PEREIRA DE SOUZA GUERREIRO RODRIGUES (UNIOESTE); CAMILA SARTOR SPIVAKOSKI (UNIOESTE); EVERTON GROHS (UNIOESTE); JOSÉ EDUARDO MAINART PANINI (UNIOESTE); ARIANE DELAI (UNIOESTE); DANIELE BARBOSA MARCHIOLI (UNIOESTE)

Resumo: Objetivo: Analisar a distribuição do Câncer Infanto-Juvenil de um Centro especializado em Oncologia Pediátrica no Oeste do Paraná. A partir destes dados o Pediatra deve alertar-se para as principais características dos tumores e buscar o Diagnóstico Precoce. Métodos: Estudo retrospectivo com análise dos prontuários de 226 casos de neoplasias em menores de 19 anos atendidos no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2012 em um serviço de Oncologia Pediátrica do Oeste do Paraná. Resultados: Foram registrados 226 casos de câncer infanto-juvenil no período estudado. A faixa etária de maior prevalência foi em menores de 5 anos(32,7%) com um discreto predomínio do sexo masculino(55,6%). A idade média ao diagnóstico foi de 9 anos. A leucemia foi a neoplasia mais frequente(28,9%), seguida do tumor de Sistema Nervoso Central(16,81%) e dos Linfomas(14,2%). Dentre as características clínicas a febre e a anemia foram mais comuns nas Leucemias; dor abdominal e/ou aumento de volume abdominal, foram mais comuns nos grupos dos tumores de Sistema Nervoso Simpático e tumores Renais; aumento de volume localizado foi a queixa mais comum nos grupos dos Linfomas e Sarcomas de partes moles; e cefaléia matutina e distúrbios visuais (estrabismo, diplopia, desvio do olhar) foram mais comuns nos tumores do Sistema Nervoso Central. O tempo médio entre o início das manifestações até o diagnóstico foi de 66 dias, havendo grande variação de acordo com os tipos de tumores. Permanecem vivos e em acompanhamento pela instituição 175(74,43%) pacientes. Conclusão: No Câncer Infanto-juvenil as queixas iniciais podem ser inespecíficas, porém a persistência das mesmas associado a alterações laboratoriais e de exames de imagem podem sugerir o diagnóstico. Caberá ao pediatra a suspeita e o encaminhamento precoce para uma avaliação especializada.