



36^º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro



Trabalhos Científicos

Título: Reporte Epidemiológico De Internaciones En Pediatría En Un Hospital De Referencia De Paraguay

Autores: VIVIANA SOTOMAYOR (HOSPITAL DE CLINICAS. PARAGUAY); LETICIA RAMIREZ (HOSPITAL DE CLINICAS. PARAGUAY); SYLVIA GOTZ (HOSPITAL DE CLINICAS. PARAGUAY); RICARDO MEZA (HOSPITAL DE CLINICAS PARAGUAY); PAOLA RENNA (HOSPITAL DE CLINICAS PARAGUAY); ANA ROLON DE CAMPUZANO (HOSPITAL DE CLINICAS PARAGUAY)

Resumo: Introducción: El Asma es una enfermedad Broncopulmonar Obstructiva con manifestaciones broncopulmonares heterogéneas que puede debutar a temprana edad o incluso en la adultez. Objetivos: Definir características epidemiológicas y clínicas de pacientes pediátricos con asma. Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo, observacional, de corte transversal de pacientes con asma internados en Pediatría del Hospital de Clínicas entre enero del 2009 y agosto de 2012. Resultados: 59 pacientes consultaron por cuadro de Asma en Sala de Urgencias, de las cuales se seleccionaron 39 fichas por contar con datos completos. Género: masculino 18/39, femenino 21/39. Procedencia: urbana 36/39 pacientes, rural: 3/39; 24/39 pacientes tenían un antecedente previo, 14/39 no. Edad promedio 6.8 años y la mediana 6 años; la duración media de síntomas previos: 2 días; 8/39 pacientes presentaron al menos una consulta previa. Presentaban antecedentes de internaciones previas por igual cuadro 16/39 pacientes. Motivo de Consulta: Dificultad Respiratoria 37/39 pacientes, Tos 33/39 pacientes; Sibilancias 27/39 pacientes, Fiebre 12/39 y Disminución de la Ingesta 7/39 pacientes. La evolución fue: permanecieron en sala de urgencias 12/39 pacientes, 16/39 ingresaron a sala de internados, fueron trasladados 2/39 unidades de terapia intensiva y 8/39 a salas comunes, 1/39 paciente falleció (poseía comorbilidad asociada a trastorno neurológico). Días de internación 22/39: 24 hs o menos, 12/39 por 2 días y 5/39 pacientes durante 3 días; 28/39 pacientes completaron su tratamiento en el servicio, de los cuales 13/28 pacientes permanecieron internados por 1 día, 11/28 pacientes por 2 días y 4/28 pacientes por 3 días. Todos los pacientes recibieron Beta 2 Agonistas y Corticoides 14/39: antibióticos, 13/39: bromuro de ipatropio, 7/39: sulfato y 1/39:aminofilina. Conclusión: Se observó un ligero predominio en el sexo femenino, con edad promedio 6.8 años, con antecedentes previos, en su mayoría fueron manejados en sala de urgencia y estuvieron internados en su mayoría por 24 horas.