Trabalhos Científicos

Título: Síndrome De Stevens-johnson

Autores: GRAZIELA BOSS GAUDÊNCIO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS); CARLA TIEMI MINAMIHARA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS); HELEN LARISSE FRANCISCHETTI GABRIEL (SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS); MARIA ALINE BOSAK (SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS); ANDREA CURT (SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS)

Resumo: SINDROME DE STEVENS – JOHNSON EM PRE-PUBERE: RELATO DE CASO OBJETIVO: Relatar um caso de Síndrome de Stevens Johnson atendida no Hospital e Maternidade Municipal São José – PR. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de caso diagnosticado e tratado pela equipe de Pediatria e Dermatologia do referido hospital. Paciente admitida no serviço com lesões papulares em tronco e membros, crostas hemáticas em lábios e períneo há quatro dias. Mãe relata que lesões iniciaram dois dias após uso de ceftriaxona I.M. para tratamento de amigdalite. Inicialmente procuraram o serviço supracitado sendo medicada com Histamin e liberada. Retorna após dois dias sendo internada devido por apresentar lesões crostosas hemáticas em lábios e períneo, e febre. Nega alergia a medicações, e comorbidades. Ao exame físico apresentava lesões papulares pelo corpo, do tipo “em alvo”, crostas hemáticas em lábios, secreção purulenta em cavidade oral, e hiperemia e lesões hemáticas em períneo. RESULTADOS: Após avaliação da Dermatologia, estabelece-se o diagnóstico de SSJ. Inicia-se tratamento com prednisolona 40mg/d, hidratação venosa, higiene oral e perineal com bicarbonato de sódio, óleo mineral em regiões afetadas, Hexomedine em cavidade oral. Paciente permaneceu cinco dias internada, com involução das lesões em 72h, sem intercorrências durante o tratamento. CONCLUSÃO: Embora a SSJ seja um fenômeno patológico de ocorrência rara, apresenta implicações serias que podem colocar em risco a vida do paciente. Sendo assim, é importante o diagnostico precoce para realizar medidas de suporte e manutenção, troca ou interrupção da droga suspeita e reduzir a morbimortalidade causada por esta síndrome.