36º CONGRESSO BRASILEIRO DE PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro
CURITIBA | PR
Expotrade Convention Center
8 A 12 DE OUTUBRO 2013

Trabalhos Científicos

Título: Aplicação Do Youth Self-report Para Avaliação De Transtornos Mentais Entre Adolescentes Do Ensino Médio

Autores: MARCOS ANTONIO DA SILVA CRISTOVAM (UNIOESTE); SANDRA BAGGIO MUZZOLON (UFPR); LÚCIA HELENA COUTINHO DOS SANTOS (UFPR); JULIANA PAVESI (UNIOESTE); CAROLINE MARTINS BETTONI (UNIOESTE); NELSON OSSAMU OSAKU (UNIOESTE); GLEICE FERNANDA COSTA PINTO GABRIEL (UNIOESTE); TENILLE GIACOBO PIRES (UNIOESTE); ELISA BOHNERT (UNIOESTE)

Resumo: Objetivo: Detectar a prevalência de transtornos mentais (TMs) pela aplicação de questionário padronizado em adolescentes do ensino médio. Métodos: após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelos pais ou responsáveis, foi aplicado o questionário para adolescentes entre 11 e 18 anos YOUTH SELF-REPORT (YSR) em estudantes do ensino médio de 26 colégios da rede pública estadual do município de Cascavel-PR. Este trabalho teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIOESTE sob protocolo CR número 955/2010. Resultados: A idade média foi de 15,5 anos, variando de 15 a 18 anos. Preencheram o YSR 989 alunos com predomínio feminino (F): 694 (70,1%). No sexo feminino 42% apresentaram escores normais e no masculino (M) 18%. As síndromes encontradas com maior frequência foram Ansiedade/Depressão (18,6%), Comportamento Agressivo (6,8%), Problemas de Atenção (4,7%) e Problemas Sociais (2,8%), todas mais prevalentes no sexo feminino. Conclusão: Os TMs são importantes porque resultam em sofrimento para os indivíduos e para o seu entorno, interferindo no desenvolvimento psicossocial e educacional do adolescente. Neste estudo o sexo feminino apresentou maior vulnerabilidade para todas as síndromes, sendo a Ansiedade/Depressão a mais frequente, seguida por Comportamento Agressivo e Problemas de Atenção. A prevalência de sintomas de Ansiedade/Depressão foi mais elevada que a encontrada na literatura (6%), sendo este o TM mais comum, em concordância com outros estudos. O YSR se mostrou adequado para a detecção dos TM em adolescentes e pode ser empregado também no seguimento. Médicos pediatras que atendem adolescentes devem se familiarizar com os sintomas de depressão, quer pela alta prevalência como pela associação com suicídio nessa faixa etária.