



36º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro



Trabalhos Científicos

Título: Tuberculose Na Infancia, Risco Aumentado Para Pericardite

Autores: NATASHA GEISEL (HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE); PRISCILLA AGUIAR (HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE); AMANDA PINHEIRO (HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE); LORENA SILVA (HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE); NOELY DIAS (HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE); ANA PAULA SILVA (HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE)

Resumo: Introdução: A pericardite tuberculosa apresenta uma incidência de até 4% na faixa etária pediátrica. É uma complicação rara, porém de elevada gravidade na abordagem do paciente tuberculoso. Devido ao reduzido número de casos e à relativa falta de orientação quanto ao seu rastreo, muitas vezes acabamos nos deparando com casos na fase tardia, ou com sequelas. Relato de caso: MISM, 7 meses, parda, internada com tosse produtiva, febre não aferida há cerca de 20 dias, taquidispnéia, atraso no desenvolvimento psicomotor e pônbero-estatural. Na historia familiar apresenta pai em inicio de tratamento de tuberculose pulmonar, já diagnosticada há 1 ano. Realizou radiografia de tórax que evidenciou condensação em base do hemitórax direito e iniciado tratamento com penicilina cristalina, sem melhora clínica ou radiológica. Outros exames, incluindo lavado gástrico e PPD, foram realizados, ambos negativos. Este quadro associado a historia de contato e o baixo peso, a incluíram nas indicações de tratamento com o uso do sistema de pontuação do programa nacional de controle de tuberculose. Poucos dias após o inicio do tratamento com o esquema RIP, a paciente apresentou edema importante em membros inferiores e abdome, o que justificou a investigação de disfunções cardíacas, com realização do ecocardiograma que evidenciou pericardite com derrame pericárdico moderado. Foi iniciado corticoide, o que levou a melhora sensível do quadro. Discussão: A pericardite caracteriza-se por uma forma grave e tardia da tuberculose, por isso é importante o diagnóstico precoce da doença, principalmente em menores de 2 anos, como o caso da nossa paciente. Objetivamos com esse relato discutir os principais sinais e sintomas indicativos do comprometimento cardíaco da tuberculose e os benefícios de um rastreo precoce no diagnostico da tuberculose pulmonar e extra pulmonar, na faixa etária pediátrica. Ressaltar os benefícios da corticoterapia em algumas formas da tuberculose também faz-se presente.