

Trabalhos Científicos

Título: Importância Do Diagnóstico Precoce Do Tumor De Wilms

Autores: FERNANDA LAGARES XAVIER PERES (UFCSPA); NATÁLIA DASSI (UFCSPA); ANTONIA PARDO CHAGAS (UFCSPA); VERA SABARROS (HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO); ANA FENILI (HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO); DANIELA KIRST (HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO); LAURA BORBA (HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO); FERNANDA SCHERER (HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO); ADRIANO NORI TANIGUCHI (HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO); MARIANA BOHNS MICHALOWSKI (HOSPITAL DA CRIANÇA

SANTO ANTÔNIO)

Resumo: Introdução O câncer representa a primeira causa de morte por doença entre crianças de 1 a 19 anos. Tumores renais representam de 5% a 10% das neoplasias, sendo a maioria nos menores de cinco anos. A apresentação clínica inicial mais frequente é a presença de massa abdominal assintomática. Hipertensão arterial, dores abdominais, hematúria macroscópica, anorexia, vômitos, febre e associação com anormalidades congênitas podem ocorrer. Este caso objetiva chamar a atenção para o diagnóstico diferencial das massas abdominais e ratificar a importância do diagnóstico precoce. Descrição de Caso S.F.G, feminina, 11 meses, natural e procedente de Canoas. Consultava regularmente na UBS com médico generalista e nas emergências. Há dois meses, mãe levou menina a UBS por dores abdominais e irritabilidade. Foi liberada com sintomáticos. Dias após, percebeu massa abdominal e procurou a emergência. Após exame clínico, fez-se ecografia abdominal que evidenciou massa renal unilateral. A paciente foi encaminhada ao nosso serviço. Chegou nutrida, descorada, irritada, com massa palpável em hipocôndrio esquerdo, estendendo-se até fossa ilíaca e ultrapassando a linha média. Realizou TC abdome: massa renal de 9,2x8,9cm sugestiva de tumor de Wilms. Fez quimioterapia por 4 semanas e nefrectomia à esquerda. Anatomopatológico confirmou tumor de Wilms localizado. Comentários Estima-se que cerca de 70% das crianças com câncer possam ser curadas se diagnosticadas precocemente e tratadas em centros especializados. Com a descrição deste caso, chamamos a atenção para a importância do exame clínico e a valorização das queixas do paciente e de seus familiares, bem como para investigação de qualquer massa abdominal.