Trabalhos Científicos

Título: Herpes Zoster Em Criança Sem Antecedente De Varicela

Autores: NATHÁLIA TRAVASSOS SARKIS (HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE - BRASÍLIA/DF); GILSON LUIZ BONOMI (HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE - BRASÍLIA/DF); JOÃO TADEU VITALI (HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE - BRASÍLIA/DF)

Resumo: Introdução: O Herpes zoster - HZ é uma infecção cutânea provocada pela reativação do vírus varicela - zoster (VZV) que está latente na raiz dorsal dos gânglios sensoriais. Os fatores desencadeantes são desconhecidos, mas pode haver associação com a redução da imunidade celular. A manifestação clínica na infância é rara e está frequentemente descrita em lactentes que foram infectados in utero ou durante o primeiro ano de vida. Caso clínico: Paciente, 6 anos, apresentou vesículas coalescentes de base eritematosa que seguia dermátomo em região de hemitórax direito ao nível de T4 - T8 de aparecimento súbito e com carater doloroso e pruriginoso. Paciente não apresentava história de varicela ou vacinação anterior. Mãe negou quadro prévio pessoal de varicela. Realizado o diagnóstico clínico de Herpes Zoster. Iniciado tratamento com aciclovir - 250mg/m2 - endovenoso, de 8/8 horas por 7 dias. Paciente evoluiu bem. Houve regressão das lesões vesiculares para crostosas em 5 dias após início da medicação e remissão total em 15 dias. Discussão: A manifestação clínica de HZ ocorre em 15 a 20% dos indivíduos expostos ao VZV. Este ao ser reativado é transportado para a pele por meio dos axônios neuronais e desencadeia um exantema vesicular localizado. O aparecimento do HZ em criança imunocompetente pode ser atribuído a imaturidade do sistema imunitário e também a existência de anticorpos maternos que podem modificar a resposta imunológica ao VZV, conduzindo a uma infecção primária subclínica. O diagnóstico é clínico, mas pode ser realizado isolamento do vírus em cultura ou dosagem de anticorpos anti - VZV. O tratamento deve ser iniciado precocemente e a medicação utilizada é antiviral. Conclusão: É fundamental questionar a possibilidade do diagnóstico de Herpes Zoster em crianças que não possuem história prévia de varicela para que o tratamento seja realizado corretamente e assim, possa ser evitado possiveis complicações.