



36^º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro



Trabalhos Científicos

Título: Artrite Idiopática Juvenil Sistêmica Em Lactente

Autores: NATÁLIA NOGUEIRA VIEIRA (FACULDADE SÃO LUCAS); REBEKA MAYARA MIRANDA DIAS FOGAÇA (FACULDADE SÃO LUCAS); GABRIEL DE DEUS VIEIRA (FACULDADE SÃO LUCAS); ALESSANDRA YUKARI YAMAGISHI (FACULDADE SÃO LUCAS); THAIANNE DA CUNHA ALVES (FACULDADE SÃO LUCAS); GISELE MEGALE BRANDÃO GURGEL (FACULDADE SÃO LUCAS)

Resumo: **INTRODUÇÃO:** A artrite idiopática juvenil (AIJ) é uma doença comum na infância, de etiologia desconhecida e caracterizada por inflamação articular persistente. **DESCRIÇÃO DO CASO:** MECF, feminino, 16 meses, natural e residente de Mirante da Serra-RO. Mãe relata que procurou serviço de saúde de sua cidade apresentando inchaço no joelho esquerdo há 1 mês. O quadro iniciou há 5 meses com febre de 38°C, tendo 2 picos diários, melhorando após uso de antitérmico. Realizou coleta de urina através do saco coletor sem urocultura, sendo diagnosticado e tratado como Infecção do Trato Urinário. Posteriormente apresentou linfadenopatia cervical bilateral, edema em punho esquerdo, e emagrecimento, sendo encaminhada para o Centro Especializado em Pediatria de RO. Ao exame físico observaram hepatoesplenomegalia, exantema difuso nos picos febris, e limitação de movimentos em dedo médio. Exames de admissão: hemograma com anemia normocítica e normocrômica, leucocitose com neutrofilia e desvio à esquerda, e plaquetas normais; sorologias: toxoplasmose, citomegalovírus, Espstein-Barr, HIV, hepatites B e C e sífilis, negativas; ASLO, ASO, FAN e fator reumatoide, negativos; PCR, VHS, mucoproteínas e ferritina, elevados; ecocardiograma sem alterações; ultrassonografia articular em joelho esquerdo evidenciou discreto derrame articular. Foi diagnosticada como AIJ sistêmica, e prescrito Prednisona e Methotrexate, obtendo melhora do quadro clínico. **DISCUSSÃO:** O diagnóstico de AIJ é clínico e por exclusão. Possui os seguintes critérios: artrite em uma ou mais articulações, idade menor que 16 anos, duração mínima de 6 semanas da artrite na mesma articulação e exclusão de outras doenças. A Liga Internacional de Associações para o Reumatismo subdivide a AIJ em: sistêmica, oligoarticular, poliarticular, artrite psoriática, artrite relacionada à entesites e outras artrites. Os objetivos do tratamento são: controlar a dor, diminuir o processo inflamatório e prevenir deformidades. **CONCLUSÃO:** As manifestações iniciais inespecíficas da AIJ dificultam o diagnóstico, pois se assemelha a outras doenças, como leucemias e doenças infecciosas.