



36^º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o futuro



Trabalhos Científicos

Título: Tuberculose Extra-pulmonar Na Infância: Um Desafio Ao Diagnóstico Precoce

Autores: BEATRIZ RABELLO DE CAMARGO NETA (UFT); HUGO MIGUEL DOS SANTOS (UFT); ELAINE CARNEIRO LÔBO (UFT); MYRLINA REGINA MESCOU TO BORGES (UFT); REBECA GARCIA DE PAULA (UFT); CAMILA MIRI (UFT); CAROLINA RADY NARDINE DIRCEU (UFT); MAYSA ANTÔNIO VIEIRA CAVALCANTE (UFT); GISLAYNE DOS SANTOS ROTA (UFT); SILVIA THALITA MORAIS (UFT)

Resumo: Introdução: A tuberculose extrapulmonar pode ocorrer em qualquer idade. Crianças pequenas e adultos HIV-positivos são particularmente susceptíveis. Os casos de tuberculose extrapulmonar (TBE) representam até 25% dos casos de TB. O diagnóstico definitivo de TB extrapulmonar é muitas vezes difícil. Descrição do caso: Paciente, sexo masculino, 10 anos, indígena, pai e tia tratados de TBP adequadamente; avô sem relato de tratamento adequado, irmã falecida com TBP. Paciente iniciou quadro icterico com evolução de 30 dias. Ao exame físico, linfonodomegalia axilar esquerda e hepatomegalia de 5,6cm do BCD, TGO=128 e TGP=144mU/l, BT=4,3mg/dl. TC de abdômen revelou conglomerados de aspecto linfonodal, situados nas regiões peripancreáticas e pericelíacas determinando compressão sobre o colédoco com consequente volumosa dilatação das vias biliares intra-hepáticas. Na TC de tórax observou-se múltiplas linfadenomegalias mediastinais, determinando pequena compressão sobre a traquéia. PPD de 25mm. Iniciou-se o tratamento com esquema RIPE. Discussão: A história de contágio com adulto tuberculoso deve ser valorizada, principalmente, nas crianças até a idade escolar. A informação sobre o eventual convívio da criança com adulto tuberculoso bacilífero é de grande importância. Na TB ganglionar as cadeias linfonodais mais acometidas são as mesentéricas e peripancreáticas, aparecendo na TC como áreas com baixa densidade central e captação periférica do meio de contraste. A história epidemiológica, o PPD e os achados em imagens foram decisivas para o início do tratamento. Conclusão: A tuberculose representa um importante problema de saúde para as comunidades indígenas. No caso das formas extrapulmonares, além do PPD os exames de imagem, tais como tomografia computadorizada, podem contribuir para a identificação de hepatomegalias, esplenomegalias ou linfadenomegalias abdominais, orientando a coleta de materiais, se necessário e fortalecendo o diagnóstico de TBE.