



36^º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro



Trabalhos Científicos

Título: Meningite Por *Streptococcus Agalactiae* Em Lactente Maior De 1 Mês De Vida.

Autores: FABRICIA VIEIRA RODRIGUES (HOSPITAL MUNICIPAL DO CAMPO LIMPO); BRENDA SILVA TAVARES (HOSPITAL MUNICIPAL DO CAMPO LIMPO); CLEOMAR SÉRGIO PIRES ALVES (HOSPITAL MUNICIPAL DO CAMPO LIMPO); JULIANA ASSIS DO CARMO (HOSPITAL MUNICIPAL DO CAMPO LIMPO); GISELE DOURADINHO TEIXEIRA (UNISA); PRISCILA ALENCAR BARREIRA (UNISA)

Resumo: Lactente de 1 Mês e 16 dias dá entrada no pronto socorro por apresentar 2 episódios de vômitos, rejeitando o seio materno, afebril. Com antecedente de ter nascido de parto normal 35 semanas, 1980g com 24h de vida teve diagnóstico de sepse neonatal com Hemocultura positiva para *E. coli* (confirmado com o resumo de alta que a mãe trouxe). Teve alta com 18 dias de vida tendo ficado 15 dias na UTI. Quadro Clínico: REG, pálida 1+/4+, acianótica, anictérica, eupneico, rejeitando seio materno, afebril. MV+ bilateral e simétrico SRA, RCR 2T BNF sem Sopros. Abd: plano, flácido, depressível sem visceromegalia. SN: Estática, sem irritabilidade, atônica, sem sinais meningeos. FANT. Foi solicitado exame de Hemograma, Proteína C reativa e Urina I com resultados de Hemograma: Hb 10g/dl, Hto 30%, leucócitos 9600/ml neutrófilos 65% Segmentados 10% Linfócitos 15% Monócitos 10%. Paquetas 630.000 PCR 9,6; Urina I Leucócitos 85.000/ml Hemácias 20.000/ml. Criança permanecia atônica com aspecto séptico. Decide-se colher liquor. Aspecto leitoso. Solicita-se hemocultura e isolamento para lactente. Inicia-se tratamento empírico com Ampicilina+ Amicacina pensando em meningite por *Haemophilus influenzae* tipo B, ou pneumococo. Culturas hemocultura negativa e do Liquor Positivo para *Streptococcus agalactiae*. (Beta hemolico grupo B). Foi mantido o mesmo tratamento complementando 14 dias de tratamento. Ao investigar a anamnese da gestação da mãe da criança, soube-se que a mãe não tinha feito o exame de prevenção para EGB, e nem foi realizado a profilaxia no parto. Criança teve alta com 20 dias de internação, Ativa, com BEG, acianótica, anictérica, boa perfusão periférica com boa sucção do seio materno. Foram realizados CT de crânio mas no momento não foi possível detectar sequelas.