



36<sup>º</sup> CONGRESSO BRASILEIRO DE  
**PEDIATRIA**  
O olhar que prepara para o Futuro



## Trabalhos Científicos

**Título:** Adenite Por Micobactéria Secundária A Procedimento Endodôntico

**Autores:** MARIANA SILVA FERRAZ (HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES); ROZANA ALMEIDA (HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES); TERESA SERRADAS (HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES); NAYARA RODRIGUES (HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES)

**Resumo:** **INTRODUÇÃO** As Micobactérias de crescimento rápido são bacilos oportunistas aeróbicos, imóveis, álcool-ácido resistentes. São facilmente encontradas no solo, poeira, pedras, água/biofilme, podendo estar presentes em encanamentos e materiais médico-hospitalares devido a resistência a produtos usados para desinfecção. Podem levar a doenças pulmonares, de pele e infecções de feridas cirúrgicas. **CASO CLÍNICO** Menina, 5 anos, branca, com relato de surgimento de tumoração de cerca de 8 cm em seu maior eixo em região submandibular esquerda, com sinais flogísticos. Diagnosticado adenite bacteriana, tendo feito uso domiciliar de cefalexina e ceftriaxone sem melhora do quadro. História de ter iniciado tratamento endodôntico há três meses. História familiar negativa para BK. Internada para investigação e iniciado clindamicina. Avaliado pela odontologia, que optou por extrair o dente que vinha sendo tratado, que era decíduo. Hemograma normal, PPD não reator, provas de atividade inflamatória normais. USG: linfonodo volumoso, heterogêneo e hipervascularizado. TC: linfonodomegalias níveis I e II. Cultura da secreção: BAAR positivo de crescimento rápido, em isolamento. Biópsia: processo granulomatoso com necrose caseosa e liquefativa. Foi afastado BK. Iniciado tratamento com azitromicina. No momento, em bom estado geral, com resolução parcial do quadro, aguardando identificação da micobactéria. **DISCUSSÃO** As infecções de pele podem se apresentar como abscessos agudos e supurativos, podendo evoluir com inflamação crônica, úlceras e fístulas que não respondem a antibióticos habitualmente utilizados para controle de germes típicos. Diante deste quadro deve ser feita suspeita de infecção por outros microorganismos não habituais. **CONCLUSÃO** As micobactérias estão fortemente relacionadas a procedimentos invasivos, devendo ser sempre suspeitadas em caso de complicações infecciosas. São relatados com maior frequência após procedimentos invasivos médicos, como cirurgias plásticas, oftalmológicas, ortopédicas, cardíacas, laparoscópicas e hemodiálise.