



36^º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro



Trabalhos Científicos

Título: Encarceramento De Hérnia De Littré Em Paciente Pediátrico: Relato De Caso

Autores: NATÁLIA COCHRANE MARTINS (INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA); JULIANA PAIVA DE SOUZA (INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA); JULIO CESAR PELEGRINI SILVA FILHO (INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA); MÁRCIO FERNANDES NEHAB (INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA)

Resumo: Introdução: A hérnia umbilical tem elevada prevalência na infância, porém complicações como encarceramento são raras. Denomina-se hérnia de Littré quando o divertículo de Meckel é encontrado dentro do saco herniário, cuja primeira descrição foi feita pelo cirurgião Alexis Littré em 1700. Descrição do Caso: V.H.P.S., masculino, 1 ano 4 meses, com diagnóstico de hidrocefalia com derivação ventrículo peritoneal, genitália ambígua e hérnia umbilical. Seu cariótipo é normal. Foi admitido no hospital com encarceramento da hérnia umbilical. O exame radiológico e ultrassonográfico confirmaram esse diagnóstico. Após a laparotomia exploradora para ressecção e anastomose do segmento intestinal seguidos de herniorrafia umbilical, o laudo histopatológico evidenciou o divertículo de Meckel dentro do conteúdo do saco herniário. Discussão: A hérnia umbilical é causada por fraqueza na aderência entre o remanescente cicatrizado do cordão e do anel umbilical. Em 80% dos casos ocorre o fechamento do anel até cerca de 4 anos de idade. Indicações de reparo cirúrgico incluem hérnias maiores de 2 cm, encarceramento e pacientes portadores de derivação ventrículo peritoneal. Dentre as complicações o encarceramento é a principal. O divertículo de Meckel é a anomalia mais comum do trato gastrointestinal e acomete 2% da população. Seu conteúdo é formado por mucosa ectópica, geralmente gástrica. O encontro do divertículo de Meckel no saco herniário é um evento extremamente raro. Após a descrição de Alexis Littré em 1700, a hérnia que contém o divertículo de Meckel dentro do saco herniário ficou conhecida como hérnia de Littré. Trata-se de um achado raro e há poucos casos descritos na literatura. O tratamento é cirúrgico com ressecção do divertículo de Meckel e herniorrafia. Conclusão: Hérnias de Littré são raras, e na maioria dos casos o diagnóstico é intraoperatório. Em crianças, o encarceramento, apesar de incomum, afeta geralmente os menores de 2 anos. Tem bom prognóstico pós operatório.