Trabalhos Científicos

Título: Tuberculose Ganglionar Em Lactente: Um Relato De Caso

Autores: ESTHER FERREIRA SANTOS GIOLO (UNIRIO); LUIZ HENRIQUE ZANATA PINHEIRO (UNIRIO); TEREZINHA MARTIRE (UNIRIO); RODRIGO PANNO BASÍLIO DE OLIVEIRA (UNIRIO); ANA CAROLINA MONTEIRO (UNIRIO); GEÓRGIA SILVA RODRIGUES (UNIRIO); HEITOR GUINANCIO DE SOUZA (UNIRIO); NATÁLIA PINHEIRO DUQUE ESTRADA (UNIRIO); SILVIA MARIA GUIMARÃES SIMÕES (UNIRIO); TAÍS AURICCHIO DE MIRANDA (UNIRIO)

Resumo: Introdução A Tuberculose ganglionar é uma doença que cursa com adenomegalia de evolução lenta, em cadeia cervical, geralmente unilateral, que responde mal a antibioticoterapia. Este estudo objetiva alertar os pediatras para o diagnóstico da doença em lactentes. Descrição do Caso A.F.A., masculino, aos 10 meses de idade apresentou tosse seca, febre baixa noturna, com secreção espessa amarelada em vias aéreas superiores. Apresentava linfonodomegalia difusa bilateral em cadeia cervical anterior e posterior, com linfonodos consistentes, móveis, indolores e gânglios palpáveis em região supraclavicular esquerda. À ausculta respiratória apresentava crepitação em base de hemitórax direito. A radiografia evidenciou consolidação medial na porção anterior do lobo inferior direito do pulmão. Criança mostrou-se forte reatora ao teste tuberculínico. Foi realizada biópsia excisional de linfonodos cervicais, cujo laudo acusou tuberculose como etiologia mais provável. Discussão Paciente apresentava sintomas compatíveis com tuberculose ganglionar. Foi relatado contato com padrasto da mãe, falecido por tuberculose meses antes do início dos sintomas do lactente. É recomendada a quimioprofilaxia ou tratamento da infecção latente em recém-nascidos coabitantes de caso índice bacilífero e vacinação posterior, o que não foi realizado. O pediatra deve atentar-se aos diagnósticos diferenciais como: linfomas, micobacteriose atípica, toxoplasmose, bartonelose, entre outros. Após a biópsia, a tuberculose ganglionar foi confirmada e o tratamento iniciado com evolução favorável. Conclusão Pacientes com linfadenopatia cervical frequentemente apresentam infecção como etiologia. Este caso alerta para a necessidade de um alto grau de suspeição clínica dentro de um contexto clínico-epidemiológico, e a necessidade da biópsia, para que os casos sejam diagnosticados. Enfatiza também a importância crescente da tuberculose ganglionar como diagnóstico diferencial de linfadenopatias cervicais, principalmente no estado do Rio de Janeiro. O atraso na realização do exame contribui para a queda da qualidade de vida do paciente e tratamento inadequado da patologia.