



36^º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro



Trabalhos Científicos

Título: Internações Por Paralisia Flácida Em Pacientes Pediátricos - Quando Pensar Em Mielite Transversa?

Autores: ENEIDA QUADRIO OLIVEIRA VEIGA (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); PRISCILLA MAGALHÃES FELEPPA VALENTE (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); CASSIA GOBARA E FARIA (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); SILVIA ANDERSON CRUZ (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); MARIELLY MATIAS MACHADO (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); FELIPE MACHADO MOLITERNO (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); SOLIMAR STUMPF CORDEIRO (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); ADRIANA MARIA TAVARES GOMES GONÇALVES (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); SUSIE ANDRIES NOGUEIRA (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); ALVARO JOSE MARTINS OLIVEIRA VEIGA (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO)

Resumo: Introdução: A Vigilância sistemática das Paralisias Flácidas Agudas (PFA) e as altas taxas de cobertura vacinal contra a poliomielite são estratégias para este diagnóstico com posterior adoção de medidas de controle capazes de impedir sua disseminação. Em todos os casos de PFA, é necessária a notificação imediata pelo serviço de saúde, investigação e pesquisa do vírus. Diante de dois casos suspeitos de Mielite Transversa, esse trabalho vem ressaltar a importância de uma revisão no perfil epidemiológico da PFA em nosso país. Descrição de dois casos: Caso 01: M.J.A.J., masculino, 14 anos, iniciou quadro com paraplegia e parestesia de membros inferiores, retenção urinária e incontinência fecal, uma semana após início de quadro viral. Caso 02: S.N.F., masculino, 5 anos apresentou quadro de dor abdominal, disúria e retenção urinária, evoluiu com dificuldade para deambular e hipotonia de membros inferiores, 30 dias após quadro viral. Os dois casos eram do sexo masculino e provenientes da mesma região demográfica. Os pacientes analisados apresentaram episódios virais prévios, porém com períodos de surgimento distintos. Discussão: No Brasil entre 2008 e 2012 foram notificados 2129 casos suspeitos de PFA sendo 73 no estado onde foi realizado este levantamento. Destes, cinco casos no município do estudo (3 em adultos e 2 pediátricos) nestes últimos cinco anos. Conclusões: A subnotificação de casos de Paralisia Flácida Aguda, além de implicar uma estimativa equivocada, acarreta uma sub-alocação de ações e recursos para o seu enfrentamento. O acesso real ao número de casos permite uma vigilância epidemiológica adequada, de modo que um surto possa ser identificado precocemente e todas as medidas de controle possam ser efetivamente realizadas. A causa da doença é desconhecida, entretanto cerca de 30 % a 40 % dos casos aparecem depois de doenças virais inespecíficas como foi observado em nossa casuística.