



36^º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro



Trabalhos Científicos

Título: Parotidite Recorrente, Um Achado Primário Na Síndrome De Sjogren

Autores: ENEIDA QUADRIO OLIVEIRA VEIGA (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); ALVARO JOSE MARTINS OLIVEIRA VEIGA (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); SOLIMAR STUMPF CORDEIRO (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); RAFAEL ADE NOGUEIRA (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); RODRIGO RENEE FERREIRA (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); RODRIGO SPÍNOLA E SILVA (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); SILVIA ANDERSEN CRUZ (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); ADLIZ DA ROCHA SIQUEIRA (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); IRENE CORDEBEL (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); NATHALIA VEIGA MOLITERNO (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO)

Resumo: Introdução: Parotidite é uma condição comum na pediatria, contudo é multifatorial e quando encontrado de forma recorrente, pode tratar-se de um achado primário da Síndrome de Sjögren. Esta é uma doença autoimune crônica tipicamente associada à xerofthalmia e à xerostomia em adultos, mas na infância ela é uma patologia rara e que se comporta de forma bem diferente. Sendo necessário um conhecimento amplo da doença para que se possa fazer o diagnóstico em pediatria. Relato de caso: Escolar, 12 anos, sexo masculino, há seis anos iniciou quadro recorrente de “tumoração” em região parotídea esquerda, acompanhados de dor, hiperemia e hipertermia locais, além de febre e inapetência, sempre tratado com antibioticoterapia e posterior regressão dos sintomas. Em Junho apresentou novo episódio, que não cedeu com antibioticoterapia oral, sendo indicada sua internação. Em nosso serviço iniciamos investigação para parotidite de repetição e encontramos anormalidades laboratoriais clássicas da síndrome de Sjögren: positividade do Anti-Ro/SS-A; Anti-La/SS-B; Fator Reumatóide, FAN e VHS aumentado. O paciente foi encaminhado para acompanhamento no ambulatório de reumatologia e multiprofissional de forma a minimizar suas complicações e sequelas. Discussão: A Síndrome de Sjögren infanto-juvenil é uma doença rara, com predomínio do sexo feminino e uma idade média de apresentação aos 10 anos. É frequente a ausência de xerofthalmia e xerostomia, os sintomas mais comuns na forma adulta, devido ao curto período de evolução da doença, fazendo-se necessário uma abordagem diagnóstica adaptada para faixa etária pediátrica. Conclusão: A Síndrome de Sjögren deve ser considerada em casos de parotidite de repetição, apesar da sua baixa incidência em crianças, para que se obtenha um diagnóstico precoce e se faça um acompanhamento multiprofissional adequado.