



## Trabalhos Científicos

**Título:** Doença Celíaca Em Criança Portadora De Síndrome De Goldenhar

**Autores:** CAMILA MENEZES RABELO (HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA); VERA REGINA APOLIANO RIBEIRO (HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA); ERLANE MARQUES RIBEIRO (HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA); LEONARDO SOARES PEREIRA (HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA)

**Resumo:** A Doença Celíaca (DC) é causada pela intolerância permanente ao glúten e se expressa por enteropatia mediada por linfócitos T em indivíduos geneticamente predispostos. A forma clássica se caracteriza pela presença de diarreia crônica, distensão abdominal e perda de peso. Já as formas atípicas ocorrem quando as manifestações digestivas estão ausentes ou, quando presentes, ocupam um segundo plano, e outros sistemas orgânicos são acometidos. O tratamento consiste em dieta com total isenção do glúten por toda a vida. A Síndrome de Goldenhar (SGH) é uma anomalia congênita rara, de etiologia desconhecida, caracterizando-se por alterações oculares, auriculares e vertebrais, além de outras manifestações decorrentes de erros na morfogênese do 1º e 2º arcos branquiais, com predomínio no sexo masculino. Criança, sexo feminino, 1 ano de idade, com história de diarreia crônica desde os primeiros meses de vida associada à distensão abdominal e queda na curva pondero-estatural. À investigação, as sorologias foram positivas para DC e na endoscopia digestiva alta com biópsia duodenal foram evidenciados achados característicos. Associado ao quadro, apresentava infecções urinárias de repetição, que durante investigação à ultrassonografia de abdome foi visualizado rim direito ectópico em pelve. Ao exame, apresentava distensão abdominal, déficit pondero-estatural e hipotrofia de musculatura glútea. Associava-se também assimetria facial e microtia à direita, que com a alteração renal e cariótipo excluindo outras malformações, indicava SGH. Em pesquisas realizadas não encontramos associação entre Síndrome de Goldenhar e Doença Celíaca, sendo provavelmente, este, o primeiro caso da literatura descrito. Tanto a Doença Celíaca como a Síndrome de Goldenhar devem ser precocemente diagnosticadas, pois trazem graves consequências aos seus portadores, sobretudo quando expostos a um diagnóstico tardio. Melhorar a qualidade de vida do paciente, reduzir danos e complicações são funções do pediatra que devem estar capacitados a reconhecer seus sinais e sintomas característicos precocemente.