



36^º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro



Trabalhos Científicos

Título: Hamartoma Na Infância: Apresentação De Caso E Revisão Da Literatura

Autores: DANIELA SANTOS BOSAPO (UFMA); CAROLINA SANTOS BOSAPO (UFMA);
EDUARDO PEREIRA BOSAPO (UFMA)

Resumo: Introdução: Hamartoma é uma malformação benigna congênita, bastante incomum na prática otorrinolaringológica^{5,11,12}, caracterizado por crescimento anormal de um conjunto de tecidos nativos de determinada área, originários de qualquer uma das camadas germinativas^{7,8,9,10,11,12} – endoderme, mesoderme ou ectoderme – frequentemente com um tipo de tecido predominante^{5,11}. Inicialmente descrito por Reye como um tumor derivado de miofibroblastos e referido como Tumor fibromatoso subdérmico da infância⁶. Relato do caso: JVSP, 3 anos e 7 meses, masculino, branco, natural e residente em Santa Inês-MA, apresentando tumoração assintomática na porção posterior da língua, não interferindo em sua deglutição ou respiração, detectado pela mãe há aproximadamente 1 ano. Ao exame otorrinolaringológico, o menor apresentava massa lisa, de contornos irregulares, consistência sólida, de cor róseo pálido. História pregressa e familiar com nada digno de nota. O paciente foi submetido à exérese cirúrgica com eletrocautério. Foi encaminhada peça cirúrgica medindo 3,2x3,0x1,5 cm para exame anátomo-patológico, sendo diagnosticado hamartoma. Na última avaliação, em 18/03/2013, encontrava-se assintomático. Discussão: Tumor raro, corresponde a cerca de 2% dos tumores de tecido conjuntivo na faixa pediátrica, predominando nos dois primeiros anos de vida, no sexo masculino³, e em 15 a 20% apresenta-se ao nascimento⁶. Acomete qualquer sítio⁶, tendo a localização mais comum na axila, sendo raríssimo na língua, como o caso apresentado. O diagnóstico diferencial se faz tireoide lingual, cisto tireoglosso, malformação vascular, e cisto de duplicação. Em casos de apresentação axilar direita, com adenopatias causadas por reação à BCG⁴. O tratamento é remoção cirúrgica total, prognóstico é bom e recidivas são incomuns^{4,6}. Conclusão: Hamartomas tem, em geral, bom prognóstico, com baixa recidivas. Hamartoma de língua é uma causa rara de tumoração em base de língua, porém o diagnóstico diferencial de massas na linha média posterior da língua sempre deve incluir o hamartoma.