



36^º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro



Trabalhos Científicos

Título: Perfil De Internação Por Gastroenterite Nos últimos Dez Anos Em Hospital Público De Ensino

Autores: ALVARO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA VEIGA (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); ENEIDA QUADRIO OLIVEIRA VEIGA (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); VERONICA LUDMILA DA SILVA SANTOS (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); LIZ ABILIO SANTOS (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); SOLIMAR STUMPF CORDEIRO (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); SILVIA ANDERSON CRUZ (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); IRENE CORDEBEL (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO); NATHALIA VEIGA MOLITERNO (FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO)

Resumo: Introdução: A gastroenterite aguda na criança é, ainda, uma das causas mais comuns de hospitalização e importante problema de saúde pública em nosso país. Porém com melhorias na qualidade de vida da população, vacinação adequada e estímulo à amamentação podem diminuir a sua morbidade. Objetivo: Analisar o comportamento das gastroenterites internadas em um hospital de ensino nos últimos dez anos. Metodologia: Estudo transversal, documental, retrospectivo, através da análise do livro de alta, nos últimos 10 anos (Janeiro de 2003 a Dezembro de 2012) de um hospital de ensino. Resultado: As gastroenterites corresponderam a 10% do total das internações pediátricas nesse período. O gênero masculino predominou em 55% dos casos. Em relação a idade, a média dos menores de um 1 ano foi de 35%, de 1 a 4 anos 42%, de 5 a 9 anos 17% e de 10 a 14 anos 6%. Segundo o DATASUS a média nacional das internações por gastroenterite nestas faixas etárias foi de 25%, 50%, 17% e 18% respectivamente. Houve um maior tempo de permanência hospitalar no primeiro ano de vida e menor no grupo de adolescentes. Na faixa etária de zero a um ano foi percebida um diminuição expressiva do número de internações a partir do ano de 2006. Entre 2003 e 2006, havia uma média de internações de 30,25 crianças/ano e partir de 2006 até 2012, houve diminuição para 17,10 internações/ano. Apenas 3 casos demonstraram gravidade e não houve óbitos no período estudado. Conclusão: Após a inclusão da vacina do Rotavírus em 2006, houve diminuição das internações nos menores de um ano, evidenciando sua eficácia e diminuindo a morbidade nessa faixa etária. Outras medidas sócio-educativas contribuíram para a redução do número de internações em todas as faixas etárias.