



36^º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro



Trabalhos Científicos

Título: Linfoma De Burkitt Como Causa De Intussuscepção Intestinal - Um Relato De Caso

Autores: FERNANDA SOUZA DE MACEDO (IPPMG/UFRJ); NATÁLIA KOPKE SOARES (IPPMG/UFRJ); VIVIAN RIBEIRO MOTTA DE ALMEIDA (IPPMG/UFRJ); LUANE ABDALLA GOUVEA (IPPMG/UFRJ); GIULIANA DE SOUZA BERNARDES (IPPMG/UFRJ); PRISCILA FEIJÓ KLAES (IPPMG/UFRJ)

Resumo: Introdução A intussuscepção ocorre quando um segmento proximal do intestino invagina para dentro do lúmen do segmento distal adjacente. Esta patologia é relativamente comum em crianças, sendo geralmente idiopática. O linfoma de Burkitt como etiologia de intussuscepção intestinal é bastante raro, sendo responsável por apenas 1,5% dos casos. Descrição do caso Menina de 4 anos e 7 meses, branca, natural de Macaé/RJ, apresentava há 04 meses dor abdominal difusa intermitente de moderada intensidade, às vezes associada a vômitos. Não havia relato de febre ou sangramentos. Durante o período, houve piora progressiva do quadro, com o surgimento de adinamia, anorexia e emagrecimento. À admissão, a menor apresentava-se emagrecida, prostrada, com abdome distendido, doloroso difusamente, porém sem massas ou visceromegalias palpáveis. Realizada tomografia computadorizada do abdome que evidenciou intussuscepção intestinal a nível cecal. Prosseguiu para laparotomia exploradora onde foi constatado invaginação de íleo terminal até o cólon transversal, além de massa de aspecto tumoral em íleo terminal. Foi realizada a ressecção de 10 cm do íleo e colectomia direita. O exame anátomo-patológico da peça evidenciou Linfoma não-Hodgkin (LNH) difuso de alto grau envolvendo íleo, ceco e apêndice cecal. O aspecto era sugestivo de Linfoma de Burkitt (LB), que foi confirmado mediante estudo imuno-histoquímico realizado. A paciente evoluiu sem intercorrências no pós-operatório e segue em acompanhamento com a Oncologia Pediátrica. Discussão O LB é um linfoma de células B germinativo altamente agressivo, frequentemente apresentando sítios extranodais. É o subtipo mais comum de LNH, correspondendo a cerca de 40% de todos os LNH na infância. Três variantes clínicas foram descritas: endêmica, esporádica e associado à imunodeficiência. A variante esporádica se apresenta principalmente como tumores abdominais. Conclusão Nos pacientes pediátricos fora da faixa etária habitual para intussuscepção intestinal a presença desta deve lembrar a associação com linfoma.