



36^º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro



Trabalhos Científicos

Título: Obstrução Intestinal Causada Por Lipoma Gigante De Mesentério No Lactente

Autores: NIEDSON THIAGO PEREIRA CAVALCANTE (HOSPITAL INFANTIL MARIA LUCINDA); DANIELE DE CASTRO JUVENAL (HOSPITAL INFANTIL MARIA LUCINDA); LIANA PAULA MEDEIROS DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE (HOSPITAL INFANTIL MARIA LUCINDA); MARIA ISABEL FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURÍCIO (HOSPITAL INFANTIL MARIA LUCINDA); MONALISA DE MOURA SILVA SAITO (HOSPITAL INFANTIL MARIA LUCINDA)

Resumo: Introdução: A obstrução intestinal ocorre quando a propulsão do conteúdo em direção ao ânus sofre interferência. Em torno de 20% das cirurgias por quadros de abdome agudo são de pacientes com obstrução intestinal. Várias são as causas de obstrução na infância sendo uma delas o Lipoma de mesentério. Descrição: RWCS, 1 ano, natural e procedente de Jaboatão dos Guararapes-PE, atendido na emergência pediátrica com queixa de diarreia, vômitos e hiporexia há 3 dias. Paciente evoluiu com quadro de distensão abdominal, desconforto respiratório e resíduo gástrico em borra de café. Submetido à laparotomia exploradora que evidenciou a existência de tumoração em meso do intestino delgado, medindo dez centímetros de comprimento. Realizado, então, exérese do tumor. Paciente evoluiu sem intercorrências no pós operatório. A análise anatomopatológica tumoral revelou lipoma em região de meso e processo inflamatório leve inespecífico. Discussão: As causas que levam mais frequentemente à obstrução mecânica no lactente são hérnia inguinal encarcerada, intussuscepção intestinal, aderências pós-operatórias e novelo de *Áscaris lumbricóides*. As tumorações são causas raras de obstrução na infância. O Lipoma de Mesentério é um tumor benigno de células adiposas maduras que se apresenta como uma massa abdominal de crescimento progressivo e assintomático, o que justifica as grandes dimensões que atinge, assim como observado neste caso. O tratamento dos lipomas gigantes é cirúrgico e consiste na sua total remoção. Alguns autores defendem a exérese completa do tumor, por entender que só o exame da peça inteira permite o correto diagnóstico. Conclusão: Autores evidenciam que o lipoma primário do mesentério é raro, com menos de 50 casos descritos na literatura inglesa e aqueles que causam obstruções do intestino são ainda mais infrequentes. Por tal motivo, dar-se a importância de se produzir mais uma fonte de esclarecimentos sobre o assunto.