



36^º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro



Trabalhos Científicos

Título: Teratoma Cístico Maduro Em Jovem Obesa, Dificuldades Diagnósticas: Relato De Caso.

Autores: GIOLANA MASCARENHAS DA CUNHA (HOSPITAL DA CRIANÇA CONCEIÇÃO - PRM PEDIATRIA - MÉDICA RESIDENTE); CLARICE LAROQUE SINOTT LOPES (HOSPITAL DA CRIANÇA CONCEIÇÃO - PRM PEDIATRIA - MÉDICA RESIDENTE); JULIANA DALL'ONDER (HOSPITAL DA CRIANÇA CONCEIÇÃO - PRM EM PEDIATRIA - MÉDICA RESIDENTE); MARTINA BORTOLON (HOSPITAL DA CRIANÇA CONCEIÇÃO - PRM EM PEDIATRIA - MÉDICA RESIDENTE); MARIA LÚCIA PEDROSA ROENICK (HOSPITAL DA CRIANÇA CONCEIÇÃO - PRM CIRURGIA PEDIÁTRICA - MÉDICA RESIDENTE); MERIENE VIQUETTI DE SOUZA (HOSPITAL DA CRIANÇA CONCEIÇÃO); PAULA DE SOUZA DIAS LOPES (HOSPITAL DA CRIANÇA CONCEIÇÃO - PRM PEDIATRIA - MÉDICA RESIDENTE); TALITA PACHECO DANI (HOSPITAL DA CRIANÇA CONCEIÇÃO - PRM CIRURGIA PEDIÁTRICA - MÉDICA RESIDENTE); ILÓITE MARIA SCHEIBEL (HOSPITAL DA CRIANÇA CONCEIÇÃO - PEDIATRA PRECEPTORA DO PRM PEDIATRIA); LUIZ ALBERTO VANNI (HOSPITAL DA CRIANÇA CONCEIÇÃO - PEDIATRA E PRECEPTOR DE PRM PEDIATRIA)

Resumo: INTRODUÇÃO A abordagem de tumorações nos anexos uterinos é cercada de dificuldades diagnósticas e particularidades em seu tratamento. Essas vertentes tornam-se mais exuberantes quando nos defrontamos com tumores anexiais na adolescência. Os teratomas constituem a neoplasia de ovário mais comum na menacme, sendo também conhecidos como teratoma cístico maduro ou cisto dermóide. DESCRIÇÃO DO CASO Adolescente de 13 anos, obesa, apresentou dor abdominal em região lombar à direita irradiada para fossa ilíaca direita, em cólica, intermitente. Menarca aos 12 anos. Apresentava-se em bom estado geral, com discreto desconforto à palpação em FID. Exame do abdome prejudicado devido à adiposidade no subcutâneo. Exames alfa-feto-proteína e HCG normais. Ecografia abdominal com limitação técnica devida a interposição de gases e compleição da paciente. Optou-se por realizar uma tomografia de abdome total que mostrou massa cística heterogênea com conteúdo de densidade líquida com gordura e densidades calcificadas, comprimindo e promovendo leve ectasia do ureter esquerdo. Submetida à ooforectomia com achado de teratoma cístico maduro de ovário com torção. DISCUSSÃO O ovário é fonte de inúmeras patologias, sejam tumorais, inflamatórias e até mesmo funcionais. A íntima relação anatômica do órgão com as tubas uterinas, muitas vezes, torna impossível o diagnóstico preciso da lesão. Além disso, a pelve é fonte de patologias urinárias, intestinais e de outras estruturas que dificultam ainda mais esse diagnóstico. A obesidade foi um fator que dificultou o diagnóstico e indicou a tomografia para melhor esclarecimento diagnóstico. CONCLUSÃO Apresentamos um quadro clássico de lesão anexial em adolescente, cujo diagnóstico foi dificultado pela obesidade. Gostaríamos de reforçar a necessidade de trabalhar-se a dieta adequada e exercícios entre nossa população de crianças e jovens.