36º CONGRESSO BRASILEIRO DE PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro
CURITIBA | PR Expotrade Convention Center 8 A 12 DE OUTUBRO 2013

Trabalhos Científicos

Título: Paracoccidioidomicose Associada A Tuberculose Ganglionar

Autores: MARCELO RESSINI (HOSPITAL INFANTIL ESTADUAL DARCY VARGAS); SARTA SANTIAGO (HIEDV); DEISE (HIEDV); JULIANA (HIEDV); CAMILA (HIEDV); WANDERLEY (HIEDV); HELMAR (HIEDV)

Resumo: Introdução: A paracoccidioidomicose é uma doença sistêmica endêmica, Causada pelo fungo dimórfico paracoccidioides brasiliensis. Embora a via primaria de infeção seja a pulmonar, pela inalação de partículas do fungo, vários sítios anatômicos podem ser acometidos pela disseminação linfohematogênica, inclusive a mucosa oral. Descrição do caso: L.E.S., 6 anos, pardo, sexo masculino, mãe com Granulomatose de Wegener, pai tabagista, não consaguíneos, nascido parto cesariana, peso de nascimento aproximadamente 4kg, termo. Internado inicialmente no Hospital Municipal do Campo Limpo devido quadro de tosse seca há 15 dias, odinofagia e dor inespecifica em membros direitos. Perda ponderal relatada. Visto em radiografia tórax, alargamento mediastinal e em tomografia computadorizada bloco lindonodal com predominância em hilo esquerdo e extensão para região cervical direita com redução de calibre brônquio fonte principal com discreta atelectasia do parenquima. Encaminhado ao Hospital Infantil Darcy Vargas para maior investigação de massa medistinal. Seguido com equipe de Oncologia Pediátrica, visto biopsia de massa mediastinal com diagnostico de Paracoccidioidomicose. Tratado em enfermaria de Pediatria Geral com Anfotericina complexo lipídico. Recebeu na alta Bactrim com seguimento ambulatorial, porém em reavaliação de tomografia computadorizada de tórax, visto liquefação central com lindonodos sugestivos de tuberculose ganglionar. Introduzido então esquema tríplice com Pirazinamida, Rifampicina e Isoniazida, apresentando melhora. Discussão: Lesões pulmonares podem ser confundidas com tuberculose , devido a suas semelhanças clinicas e radiografias. A desnutrição pode predispor quadros clínicos de extrema gravidade. conclusão: A amamnese detalhada dos pacientes portadores de paracoccidioidomicose revela importantes aspectos, como procedência e hábitos pessoais. A atuação interdisciplinar de médicos e dentistas colabora para um precoce diagnostico e adequado acompanhamento do doente.