



36^º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro



Trabalhos Científicos

Título: Alergia à Proteína Do Leite De Vaca

Autores: FABRICIA VIEIRA RODRIGUES (HOSPITAL MUNICIPAL DO CAMPO LIMPO); BRENDA SILVA TAVARES (HOSPITAL MUNICIPAL DO CAMPO LIMPO); CLEOMAR SÉRGIO PIRES ALVES (HOSPITAL MUNICIPAL DO CAMPO LIMPO); JULIANA ASSIS DO CARMO (HOSPITAL MUNICIPAL DO CAMPO LIMPO); GISELE DOURADINHO TEIXEIRA (UNISA); PRISCILA ALENCAR BARREIRA (UNISA)

Resumo: Introdução: A alergia ao leite ocorre quando o organismo da criança rejeita completamente a proteína do leite de vaca ou de qualquer outro animal, podendo sofrer graves problemas de saúde que podem inclusive levá-la a morte. Esta alergia geralmente cura-se por volta dos 3 anos de idade e até lá deve ser tratada somente com a retirada de todas as fontes de leite de vaca da alimentação. Descrição do Caso: Lactente 10 meses, masculino, referindo alergia acompanhando de diarreia com estrias de sangue, tosse seca. Apresentava exantema com máculas em todo corpo. Mãe refere a criança tido alta hospitalar há 3 dias com mesmo diagnóstico de Alergia. Refere esse era o terceiro episódio de alergia da criança no mesmo mês. O lactente tinha amamentação Mista, com Leite Materno e fórmula infantil. Foram colhidos exames. Na anamnese detalhada da criança alguns dados que foram importantes no diagnóstico final da criança. A criança estava com urticária há 4 meses, (justamente quando iniciou com a amamentação mista). Apresentava prurido em todos episódios de urticária. Diarréia teve dois episódios. Com coriza nasal há 3 dias. No segundo dia de internação substituiu a fórmula infantil por Leite de Soja, pensando na possibilidade de Alergia à proteína do Leite de Vaca. A criança no dia seguinte não apresenta exantema no corpo, e já não apresenta diarreia. Lactente teve alta apenas com Leite de Soja e inalação com Beta 2. Retornou em Uma semana para reavaliação, segundo a mãe havia aderido bem ao leite de soja e sem exantema, sem outros sintomas. Discussão: Importante no diagnóstico evitando desnutrição na criança pelos sintomas q pode ocorrer. Conclusão: Definir o diagnóstico diferenciando da intolerância à lactose, evitando os distúrbios gastrointestinais que a alergia ao leite de vaca pode ocasionar e a intolerância não.