



36º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o futuro



Trabalhos Científicos

Título: Perfil Epidemiológico Das Internações Por Pneumonia E Bronquiolite Em Um Hospital Universitário Da Região Serrana Do Rio De Janeiro

Autores: ALINE MARIA DE SOUZA MAIA (UNIFESO); LIDIA PILLO GONÇALVES (UNIFESO); INGRID ARGOLO SENA (UNIFESO); SHIRLEY KATIUSCIA NEVES GUEDES (UNIFESO); ALCEMIR GONÇALVES PETTERSON (UNIFESO); MARIA CÉLIA MARQUES DA FONSECA (UNIFESO); IZABEL CRISTINA DRUMMOND (UNIFESO); MARCELO MATUSHITA (UNIFESO)

Resumo: Objetivo: Apresentar o perfil epidemiológico das internações na enfermaria de pediatria por pneumonia e bronquiolite. Métodos: Neste estudo observacional, descritivo e transversal, foram coletados dados dos pacientes internados na enfermaria de pediatria, no período selecionado entre 01/06/2010 e 31/05/2012. Foram respeitados os princípios éticos relativos a pesquisa envolvendo seres humanos de acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados. No período compreendido foram internadas 1220 pacientes pediátricos, destes 467 foram por afecções em vias aéreas inferiores. Quanto à pneumonia, houve 294 internações, com predomínio do sexo masculino (55,1% - 162 casos), maior incidência no primeiro ano de vida – 43,8% (129 crianças, sendo 40 delas – 13,6% - até dois meses de vida), seguido por 38,1% entre 1 e 5 anos (112 casos), 13,6% entre 5 e 10 anos (40 casos) e 4,4% acima de 10 anos (13 casos). Houve predomínio de 71,8% nos meses mais frios do ano – abril a setembro, 211 casos. Quanto às crianças com bronquiolite, ocorreram 170 internações, com predomínio no sexo masculino (53,5% - 91 casos), e no primeiro semestre de vida (82% - 31 casos no 1º mês de vida, 28 no 2º mês, 25 no 3º mês, 25 no 4º mês, 14 no 5º mês, 17 no 6º mês), enquanto aquelas com idade entre 6 meses e 2 anos a incidência foi de 18%. Nos meses mais frios a incidência foi de 70% (119 casos). Houve associação das duas patologias em 66 casos. Conclusão: pneumonia e bronquiolite são patologias com significativa importância epidemiológica, com incidência maior nos meses mais frios do ano, com predomínio em lactentes.