



36^º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro



Trabalhos Científicos

Título: Dificuldade De Diagnóstico No Derrame Pericárdico Em Pediatria

Autores: CAROLINA COSTA E SILVA (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO); DENISE CRISTINA RODRIGUES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); FREDERICO MILAGRES DE OLIVEIRA (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO); LILYANE DAMASCENO MANELLA (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO); RAFAELLA FUNGARO BARAGATTI (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO); MÁRIO DINIZ (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO)

Resumo: Introdução; O derrame pericárdico pode ocorrer em pacientes com pericardite aguda ou em doenças sistêmicas, podendo ser agudo ou crônico. A principal complicação é o tamponamento cardíaco que deve ser prontamente tratado. Descrição do caso: Paciente do sexo masculino, cinco anos de idade, buscou a unidade básica de saúde, com quadro de tosse, dor abdominal, inapetência e prostração, tendo sido prescrito tratamento sintomático. Não havendo melhora, quatro dias depois buscou atendimento no hospital, tendo sido realizados anamnese e exame físico detalhados. Detectou-se à ausculta hipofonose de bulhas cardíacas, taquicardia, murmúrio vesicular reduzido à direita, abdome globoso, com macicez móvel, sugestivo de ascite, hepatomegalia a cinco centímetros do rebordo costal. Solicitou-se TC de tórax, que revelou volumoso derrame pericárdico, além de derrame pleural à direita, com volume de 180 mL, e ascite. Procedeu-se pericardiocentese, havendo melhora do quadro clínico e iniciado prednisolona. Ecocardiograma 30 dias após a pericardiocentese mostrou remissão do quadro. Alta hospitalar com 11 dias. Em redução gradual da corticoterapia Discussão O derrame pericárdico é uma condição grave, cujas principais etiologias são as colagenoses, tuberculose, síndrome nefrótica e pericardite viral. Conclusão No caso relatado, o derrame pericárdico foi atribuído a pericardite pós-viral por exclusão das outras etiologias. É importante que profissionais da área médica estejam atentos para ao exame físico afim de alcançar um adequado diagnóstico clínico e etiológico, possibilitando a instituição de terapêutica apropriada e em momento oportuno.