



36º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro



Trabalhos Científicos

Título: Retocolite Ulcerativa. Importância Do Diagnóstico Precoce

Autores: FABRICIA VIEIRA RODRIGUES (HOSPITAL MUNICIPAL DO CAMPO LIMPO);
BRENDA SILVA TAVARES (HOSPITAL MUNICIPAL DO CAMPO LIMPO); CLEOMAR
SÉRGIO PIRES ALVES (HOSPITAL MUNICIPAL DO CAMPO LIMPO); JULIANA ASSIS
DO CARMO (HOSPITAL MUNICIPAL DO CAMPO LIMPO)

Resumo: TRODUCAO: A Retocolite Ulcerativa (RCU) é um processo inflamatório idiopático crônico, restrita ao cólon e geralmente poupa o trato gastrointestinal superior. Sua incidência tem se mantido relativamente constante e é raramente observada durante a infância. Diarréia e sangue nas fezes são apresentações típicas de retocolite e o diagnóstico é firmado com achados endoscópicos e histológicos. DESCRICAO DO CASO: NSS, 3 anos, sexo feminino, iniciou com quadro de vômito, dor abdominal e diarreia sem muco, pus ou sangue . Associado ao quadro, apresentou 1 pico febril. Procurou atendimento apresentando-se em REG, afebril, com desidratação moderada, irritada, dor abdominal intensa, blumberg negativo e coprocultura negativa. Durante a internação apresentou melhora da do quadro emético e não apresentou febre, porém manteve a diarreia e evoluiu após 1 semana com hematoquezia e manutenção dor abdominal intensa. Foi solicitada propedêutica específica que apresentou espessamento parietal concêntrico de retossigmoide com densificação do tecido adiposo na fossa isquiaoanal na TC , e a EDA evidenciou ulcerações rasas, bem delimitadas em cólon descendente e sigmoide, com mucosa adjacente espessada e enantemática, associado ao apagamento da vasculatura submucosa. Foi realizada ainda colonoscopia e biopsia que firmaram o diagnóstico. Após a introdução da corticoterapia a paciente evoluiu com remissão dos sintomas. DISCUSSAO: O diagnostico precoce é de grande importância por se tratar de doença crônica, sem tratamento curativo e cujo tratamento tardio favorece surgimento de sequelas graves como câncer intestinal, transtorno psicossocial , desnutrição e baixa estatura. CONCLUSAO: o diagnostico de RCU na maioria das vezes é tardio nesta faixa etária o que piora o prognóstico da doença. Trata-se doença pouco lembrada como afecção possível nesta faixa etária devido predominância elevada de doenças infectoparasitárias como diagnostico diferencial .