36º CONGRESSO BRASILEIRO DE PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro
CURITIBA | PR Expotrade Convention Center 8 A 12 DE OUTUBRO 2013

Trabalhos Científicos

Título: Síndrome Alcoólica Fetal: Um Risco Prevenível (relato De Caso)

Autores: GREYCE LAIS DO NASCIMENTO (HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA); ANDREIA ELISA BALDISSERA (HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA); MARIANA PARIZOTTO MORAES (HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA); CRISTINA KLEIN KEUNECKE (HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA)

Resumo: Introdução: A síndrome alcoólica fetal (SAF) é um defeito inato permanente provocado pela ingestão de álcool pela mãe durante a gravidez. Caracteriza-se por acometimento do sistema nervoso central (SNC), sendo este o mais afetado, deficiências do crescimento e dismofismo facial. É a principal causa conhecida de retardo mental no mundo ocidental e é inteiramente passível de prevenção. Relato: MCL, lactente feminina, 2 meses 5 dias de vida, apresentava retardo de crescimento, dismorfismo facial e craniano, microftalmia, filtro nasal hipoplásico, lábio superior fino, hipotonia e mal formação de extremidades. Durante a internação observou-se atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e verificado que genitora possuía histórico de ingestão de álcool durante período pré-natal. Discussão: Os critérios mínimos para o diagnóstico são: retardo de crescimento pré ou pós-natal, envolvimento do sistema nervoso, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) e altera- ção do QI e do comportamento, dismorfismo facial, com ao menos dois dos seguintes sinais: microcefalia, microftalmia e/ou fissura palpebral pequena, filtro nasal hipoplásico com lábio superior fino e hipoplasia de maxilar. Conclusão: A síndrome alcoólica fetal é uma das principais causas de retardo mental possível de se prevenir. O mecanismo de ação do etanol no organismo fetal e a quantidade mínima ingerida que pode levar à síndrome ainda não foram esclarecidos, porém sabe-se que a única maneira de evitá-la é pela a abstinência do álcool no período pré-conceptual e pré-natal.